

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ベストガード粒剤

ニテンピラム粒剤

登録番号：農林水産省登録第 19103 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ニテンピラム・・・1.0%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・宮崎県・熊本県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ベストガード粒剤」が平成 30 年 10 月 10 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「ブロッコリー」に使用方法「植穴処理土壌混和」を追加し、ニテンピラムを含む農薬の総使用回数「4回以内（育苗期の散布は1回以内、水溶剤の散布は3回以内）」を「5回以内（育苗期の散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、水溶剤の散布は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「なす」の使用方法「散布」に適用病害虫名「コナジラミ類」を追加する。
- ・作物名「きゅうり」の使用時期「は種時」に適用病害虫名「アブラムシ類」および「アザミウマ類」を追加する。
- ・作物名「きゅうり」の適用病害虫名「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大部分のみ）】

次ページに記載する

#### 【注意事項の変更について】

今回の適用拡大に伴う使用上の注意事項の変更等はありません。なお、使用に当たっては商品に貼付されているラベルを参照してください。



## サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大部分のみ）】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ニテンピラムを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	アブラムシ類 アザミウマ類	セル成型育苗トレイ 1箱またはペーパー ポット1冊(30× 60cm、使用土壌 約1.5～4L) 当り50g	育苗期後半	1回	散布	5回以内 (育苗期の 散布は1回 以内、定植 時の土壌混 和は1回以 内、水溶剤 の散布は3 回以内)
		1g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
なす	アブラムシ類	5g/培土L	は種時又は 鉢上げ時	1回	育苗培土 混和	4回以内 (定植時ま での処理は 1回以内、 株元散布 及び水溶 剤の散布 は合計3 回以内)
	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	育苗期		株元処理	
	アブラムシ類	セル成型育苗トレイ 1箱またはペーパー ポット1冊(30× 60cm、使用土壌 約1.5～4L) 当り50g	育苗期後半		散布	
	コナジラミ類					
	アブラムシ類 コナジラミ類 ミナミキイロアザミウマ	1～2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
	アブラムシ類	2g/株	収穫前日まで		3回以内	
きゅうり	コナジラミ類	5g/培土L	は種時	1回	育苗培土 混和	4回以内 (定植時ま での処理は 1回以内、 水溶剤の 散布は3 回以内)
	アブラムシ類 アザミウマ類		鉢上げ時			
	アブラムシ類	1g/株	育苗期		株元処理	
	アブラムシ類 コナジラミ類					
	アブラムシ類 コナジラミ類	1～2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
	アザミウマ類					