

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイアディオン乳剤

ペルメトリン乳剤

登録番号：農林水産省登録第 15960 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：ペルメトリン・・・20.0%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：九州全県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「サンケイアディオン乳剤」は令和元年 5 月 15 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「だいず」の希釈倍数「3000 倍」に適用病害虫名「ツメクサガ」を追加する。
- ・作物名「だいず」の使用方法「無人飛行機による散布」を「無人航空機による散布」に変更する。
- ・作物名「だいこん」の希釈倍数「2000 倍」に適用病害虫名「ダイコンサルハムシ」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」に適用病害虫名「ネキリムシ類」、使用方法「株元灌注」を追加し、ペルメトリンを含む農薬の総使用回数「5回以内」を「5回以内（株元灌注は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「にんにく」の適用病害虫名「ネギコガ」の希釈倍数「2000 倍」を「2000～3000 倍」に、ペルメトリンを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「4回以内（乳剤は2回以内、粒剤は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「しそ」に適用病害虫名「ウリハムシモドキ」を追加する。
- ・作物名「ズッキーニ」のペルメトリンを含む農薬の総使用回数「3回以内」を「6回以内（乳剤は3回以内、粒剤は3回以内）」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペルメリンを含む農薬の総使用回数
だいず	マメシクイガ ヤガイモヒゲナガアブラム フタスジヒメハムシ マメハンミョウ ツメクサガ	3000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	マメシクイガ ヤガイモヒゲナガアブラム	24倍	0.8L/10a			無人航空機 による散布	
だいこん	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ ダイコンサルハムシ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫30日前 まで	4回以内	散布	4回以内
	アブラムシ類	2000～3000倍					
キャベツ	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ	2000倍	100～ 300L/10a	収穫3日前 まで	5回以内	散布	5回以内 (株元灌注 は2回以内)
	ネキリムシ類	4000～8000倍	0.5L/㎡	収穫21日前 まで	2回以内	株元灌注	
にんにく	アブラムシ類	2000～3000倍	100～ 300L/10a	収穫前日ま で	2回以内	散布	4回以内 (乳剤は2回 以内、粒剤 は2回以内)
	ネギコガ	2000～3000倍					
しそ	ハスモンヨトウ ウリハムシモドキ	4000倍	100～ 300L/10a	収穫5日前 まで	2回以内	散布	4回以内 (乳剤は2回 以内、粒剤は 2回以内)
	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類						
ズッキーニ	アブラムシ類	2000～3000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	6回以内 (乳剤は3回 以内、粒剤 は3回以内)
	フキノメイガ						

【使用上の注意事項等の変更】

- ・「無人ヘリコプターによる散布」を「無人航空機による散布」に変更する。

なお、使用の際は製品に貼付されているラベルを参照して下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122
九州北部営業所 〒841-0025
宮崎事務所 〒880-0056

鹿児島市南栄二丁目9
佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3
宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(099)268-7588
TEL:(0942)81-3808
TEL:(0985)25-7051