

サンケイ化学 農薬登録情報

ベンレート水和剤

ベノミル水和剤

登録番号：農林水産省登録第 20889 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ベノミル・・・・・・・・・・50.0%

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品「ベンレート水和剤」が令和元年6月12日付で下記の内容で適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「稲」の適用病害虫名「イネシンガレセンチュウ」に希釈倍数「100～500倍」、使用方法「24時間種子浸漬」を追加する。
- 作物名「トマト」の使用方法「散布」の本剤の使用回数「3回以内」を「5回以内」に変更する。
- 作物名「トマト」のベノミルを含む農薬の総使用回数「6回以内（種子への処理は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内）」を「6回以内（種子への処理は1回以内、灌注は2回以内、散布及び常温煙霧は合計5回以内）」に変更する。
- 作物名「やまのいも」に適用病害虫名「炭疽病」を追加する。
- 作物名「オクラ」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ）】

次ページに記載する。

【注意事項の変更について】

当該適用拡大に伴う注意事項等の変更はありません。

なお、使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

本

社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL: (099)268-7588

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 または 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ベニミルを含む 農薬の 総使用回数	
稲	ばか苗病 いもち病 イネシガレセンチュウ	乾燥種粒量の 0.5～1.0%	—	は種前 (浸種前又は 浸種後)	1回	種子扮衣	2回以内 (種子への処理 は1回以内、床 土への混和は1 回以内)	
	ばか苗病 いもち病 イネシガレセンチュウ	30～50倍				10分間 種子浸漬		
	ばか苗病	500～1000倍				6～24時間 種子浸漬		
	いもち病					12～24時間 種子浸漬		
	イネシガレセンチュウ	100～500倍				24時間 種子浸漬		
	いもち病	7.5～15倍				乾燥種粒1kg当り 希釈液30mL		種子吹き 付け処理
	トマト	萎凋病				1000倍		150～300mL/株
	菌核病	2000倍	2000～3000倍	5回以内	散布			
	葉かび病 灰色かび病							
やまのいも	炭疽病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	4回以内 (植付前までの 処理は1回以 内、植付後は3 回以内)	
	葉渋病							
オクラ	葉すす病	3000倍			3回以内		4回以内 (種子粉衣は1 回以内、は種後 は3回以内)	

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ベニミルを含む 農薬の 総使用回数
トマト	温室、 ガラス室、 ビニールハウス等 の密閉できる場所	灰色かび病	150g/10a	5L/10a	収穫前日まで	5回以内	常温 煙霧	6回以内 (種子への処 理は1回以 内、灌注は2 回以内、散布 及び常温煙霧 は合計5回以 内)