

サンケイ化学 農薬登録情報

ダントツ粒剤

登録番号:農林水産省登録 第20800号(登録会社:住友化学(株))
有効成分:クロチアニジン...0.5%
毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
販売地域:鹿児島県・宮崎県・熊本県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品『ダントツ粒剤』は平成27年1月21日付けで下記のように適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- 作物名「なばな」を追加する。
- 作物名「にがうり」を追加する。
- 作物名「ブロッコリー」の使用時期「播種時」に使用方法「セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの覆土に均一に混和する」を追加し、クロチアニジンを含む農薬の総使用回数を「4回以内(播種時の散布、育苗期の株元処理及び定植時の植穴処理土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)」から「4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)」に変更する。
- 作物名「キャベツ」の使用時期「育苗期後半」に使用方法「セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する」を追加し、クロチアニジンを含む農薬の総使用回数を「3回以内(播種時の散布、育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)」から「3回以内(定植までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内)」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法(今回の拡大部分のみ記載)】

平成27年1月21日の拡大内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
なばな	アブラムシ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴処理 土壌混和	1回
にがうり	アブラムシ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴処理 土壌混和	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クチアジンを 含む農薬の 総使用回数
ブロッコリー	アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	0.25g/株	播種時	1回	覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。	4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
	アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	0.25g/株	播種時	1回	セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの覆土に均一に散布する。	
	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	0.5g/株	育苗期後半	1回	株元処理	
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	2g/株				
キャベツ	アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	0.25g/株	播種時	1回	覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。	3回以内(定植までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内)
	アブラムシ類 ネギアザミウマ	3~6kg/10a	播種時	1回	播溝処理 土壌混和	
		6kg/10a	地床育苗期		株元散布	
	アブラムシ類 ネギアザミウマ コナガ	セル成型育苗トレイまたはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌1.5~4%) 当たり50g	育苗期後半	1回	セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する。	
	ネキリムシ類 コナガ アオムシ アブラムシ類 ネギアザミウマ ハイマダラノメイガ	0.5g/株	育苗期後半	1回	株元処理	
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴処理 土壌混和	
	ハイマダラノメイガ	1~2g/株				
	コナガ アオムシ	2g/株				



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄2丁目9番地

TEL: (099)268-7588