

サンケイ化学 農薬登録情報

スミロディー乳剤

フェンプロパトリン・MEP乳剤

登録番号：農林水産省登録第 17587 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：フェンプロパトリン・・・5.0%

MEP・・・・・・・・・・・・・・ 45.0%

毒性：劇物

販売エリア：九州全県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「スミロディー乳剤」が令和元年6月27日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「トマト」の使用時期「収穫開始 14 日前まで」を「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名「なす」の使用時期「収穫 3 日前まで」を「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名「なつみかん」を「かんきつ（みかんを除く）」、使用時期「収穫 21 日前まで」を「収穫 14 日前まで」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンプロパトリンを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数
かんきつ (みかんを除く)	コアオハナムグリ ケシキスイ類	1000~2000倍	200~ 700L/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	9回以内 (噴射は5回以 内、散布及びく ん煙は合計4回 以内)	3回以内 (樹幹処理は 1回以内)
	チャノキイロアザミウマ カメムシ類 アブラムシ類							
	ミカンハモグリガ	2000倍						
	ミカンハダニ ミカンキイロアザミウマ	1000倍						
なす	アブラムシ類 ハダニ類	1000~2000倍	100~ 300L/10a	収穫前日まで	5回以内		5回以内	5回以内
	コナジラミ類	2000倍						
トマト					2回以内		3回以内	2回以内

【注意事項の変更等について】

使用上の注意事項の変更

- ・「適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。」を追加する。

また、使用の際は商品に貼付されているラベルをご参照ください。



サンケイ化学株式会社

本社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL:(0942)81-3808
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL:(0985)25-7051