

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ベストガード粒剤

ニテンピラム粒剤

登録番号：農林水産省登録第 19103 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ニテンピラム・・・1.0%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・宮崎県・熊本県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ベストガード粒剤」は令和元年 7 月 10 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「すいぜんじな」、「トマト」および「ミニトマト」の適用病害虫名「マメハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更する。
- 作物名「トマト」および「ミニトマト」の使用時期「育苗期後半」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- 作物名「きゅうり」の使用時期「鉢上げ時」に適用病害虫名「コナジラミ類」および「アザミウマ類」を追加する。
- 作物名「ばれいしょ」を追加する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大作物のみ記載）】

次ページに記載

#### 【注意事項の変更について】

当該適用拡大に伴う注意事項の変更等はありません。

なお、商品に貼付されているラベルを参照のこと



## サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL:(099)268-7588  
宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ニテンピラムを含む農薬の総使用回数
すいぜんじな	アブラムシ類	9kg/10a	定植時	1回	植溝処理 土壌混和	2回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、株元処理は1回以内)
	アザミウマ類		収穫3日前まで		生育期 株元処理	
	ハモグリバエ類					
トマト ミニトマト	アブラムシ類	5g/培土L	は種時又は 鉢上時	1回	育苗培土 混和	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、水溶剤の散布は3回以内)
	コナジラミ類					
	アブラムシ類	1g/株	育苗期		株元処理	
	コナジラミ類	1~2g/株				
	アブラムシ類	セル成型育苗トレイ 1箱またはペーパー ポット1冊(30× 60cm、使用土壌 約1.5~4L) 当り50g	育苗期後半		散布	
	コナジラミ類					
	ハモグリバエ類					
アブラムシ類	1~2g/株	定植時	植穴処理 土壌混和			
コナジラミ類						
ハモグリバエ類	2g/株					
きゅうり	コナジラミ類	5g/培土L	は種時	1回	育苗培土 混和	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、水溶剤の散布は3回以内)
	アブラムシ類					
	アザミウマ類					
	コナジラミ類					
	アブラムシ類	1g/株	育苗期		株元処理	
	アザミウマ類					
アブラムシ類	1~2g/株	定植時	植穴処理 土壌混和			
コナジラミ類						
アザミウマ類						
ばれいしょ	アブラムシ類	3kg/10a	植付時	1回	植溝処理 土壌混和	5回以内 (植付時までの処理は1回以内、植付後は4回以内)