

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ベストガード水溶剤

ニテンピラム水溶剤

登録番号：農林水産省登録第 19102 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ニテンピラム・・・10.0%

毒性：普通物（毒物、劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「ベストガード水溶剤」は令和元年 7 月 10 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「ばれいしょ」のニテンピラムを含む農薬の総使用回数「4回以内」を「5回以内（植付時までの処理は1回以内、植付後は4回以内）」に変更する。
- ・作物名「かんしょ」に適用病害虫名「アブラムシ類」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」の適用病害虫名「ネギアザミウマ」および「ネギハモグリバエ」の希釈倍数「1000倍」を「1000～2000倍」に変更する。
- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」に適用病害虫名「クロバネキノコバエ類」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- ・作物名「なす」に適用病害虫名「カメムシ類」、希釈倍数「1000倍」を追加する。
- ・作物名「とうがらし類」の希釈倍数「1000倍」を「1000～2000倍」に変更する。
- ・作物名「きゅうり」に適用病害虫名「クロバネキノコバエ類」、希釈倍数「2000倍」を追加する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大作物のみ記載）】

次ページに記載する。

#### 【注意事項の変更について】

当該適用拡大に伴う注意事項の変更等はありません。

なお、使用の際の注意事項については商品に貼付されているラベルを参照してください。



## サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大作物のみ記載）】

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ニテンピラムを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	—	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	5回以内 （植付時までの処理は1回以内、植付後は4回以内）
かんしょ		コナジラミ類	1000倍		育苗期	3回以内		3回以内
ねぎ		アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	3回以内		4回以内 （定植時までの処理は1回以内、株元処理及び水溶剤の散布は3回以内）
		ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	1000～2000倍					
トマト ミニトマト		クロバネキノコバエ類	2000倍		収穫前日まで	3回以内		4回以内 （定植時までの処理は1回以内、水溶剤の散布は3回以内）
		アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	1000～2000倍					
なす		コナジラミ類	1000～2000倍		収穫前日まで	3回以内		4回以内 （定植時までの処理は1回以内、株元処理及び水溶剤の散布は合計3回以内）
		アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ						
とうがらし類		カメムシ類	1000倍		収穫前日まで	3回以内		4回以内 （育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内）
		コナジラミ類	1000～2000倍					
きゅうり	コナジラミ類	1000～2000倍	収穫前日まで	3回以内	4回以内 （定植時までの処理は1回以内、水溶剤の散布は3回以内）			
	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ							
	クロバネキノコバエ類	2000倍						