

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ベンレート水和剤

ベノミル水和剤

登録番号：農林水産省登録第 20889 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ベノミル・・・・・・・・・・50.0%

毒性：普通物（毒物、劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ベンレート水和剤」は令和元年 7 月 10 日付で下記の内容で適用拡大になりました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「稲（箱育苗）」に適用病害虫名「苗立枯病（フザリウム菌）」、使用時期「は種時」を追加する。
- ・作物名「さやいんげん」の希釈倍数「2000 倍」に適用病害虫名「角斑病」を追加する。
- ・作物名「はくさい」に適用病害虫名「炭疽病」、希釈倍数「2000 倍」を追加する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大作物のみ記載）】

次ページに記載する。

#### 【注意事項の変更について】

当該適用拡大に伴う注意事項等の変更はありません。

なお、使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照してください。



**サンケイ化学株式会社**

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 または 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペナルを含む 農薬の 総使用回数
稲(箱育苗)	苗立枯病 (フザリウム菌)	500~1000倍	育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5L)1箱当たり500mL	は種時	2回以内	灌注	2回以内 (種子への処理は1回以内、床土への混和は1回以内)
	苗立枯病 (トリコデルマ菌)	500~1000倍	育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5L)1箱当たり500mL	は種時1回 又は は種時と は種7日後頃の2回			
		1000倍	育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5L)1箱当たり1L				
	いもち病	500~1000倍	育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5L)1箱当たり500mL	は種時~は種7日後頃			
		1000倍	育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5L)1箱当たり1L				
		育苗箱(30×60×3cm使用土壌約5L)1箱当たり1g	—		は種前	1回	床土混和
さやいんげん	菌核病	2000倍	100~300L/10a	収穫開始14日前まで	3回以内	散布	6回以内 (種子粉衣は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内)
	角斑病						
	立枯病	1000倍	3L/m <sup>2</sup>	発芽14日後まで	2回以内	灌注	
はくさい	白斑病 菌核病	2000~3000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)
	炭疽病	2000倍					