

# サンケイ化学 農薬登録情報

## カジランSフロアブル

水和硫黄剤

登録番号：農林水産省登録第 24242 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：硫黄・・・・・・・・・・30.0%

毒性：普通物（毒物・劇物でないモノを指している通称）

販売エリア：全国

### 新規登録取得のお知らせ

弊社が開発しておりました「カジランSフロアブル」は令和元年 7 月 10 日付を以て下記の内容で新規登録いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法の内容】

- ・作物名「ひのき」の使用目的「カモシカによる食害防止」。

#### 【適用病害虫名および使用方法】

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む農薬の総使用回数
ひのき	カモシカによる食害防止	10倍	10～50mL/樹	食害発生前	—	散布	—

#### 【使用上の注意事項等】

- ・使用上の注意事項

- （1）使用する前には良く振ること。
- （2）使用する前に所定量を所定量の水に希釈し、良くかきまぜてから散布すること。
- （3）散布液量は樹木の樹高によって増減させ、特に樹木の食害が予測される箇所に重点的に散布すること。
- （4）蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- （5）散布直後の降雨または強風時の散布は効果が劣ることがあるので、天候を良く見極めてから散布すること。
- （6）散布に使用した器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は必ず回収し、環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- （7）本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は林業関係機関、林業技術者等の指導を受けること。

- ・人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法

- （1）本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。

- (2) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (3) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (4) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (5) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

• 水産動植物に有毒な農薬については、その旨

この登録に係る使用方法では該当がない。

• 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨

通常の使用方法では該当がない。

• 貯蔵上の注意事項

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく冷涼で子供の手が届かない場所に密栓して保管すること。

なお、使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照して下さい。



## サンケイ化学株式会社

本社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588
東京本社	〒110-0005	東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL:(03)3845-7951
大阪営業所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F	TEL:(06)6305-5871
東京営業部	〒366-0032	埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL:(048)551-2122
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL:(0942)81-3808
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL:(0985)25-7051