

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイ エムダイファー水和剤

マンネブ水和剤

登録番号：農林水産省登録第 10559 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：マンネブ・・・75.0%（FRACコード：MO3）

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：九州以外

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「サンケイ エムダイファー水和剤」は令和元年 10 月 9 日付で下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「りんご」の使用時期「収穫 60 日前まで」を「収穫 30 日前まで」、本剤の使用回数およびマンネブを含む農薬の総使用回数「2回以内」を「1回」に変更する。
- ・作物名「みかん、かんきつ（みかんを除く）、りんご、なし、かき」の使用液量「一」を「200～700L/10a」に変更する。
- ・作物名「ばれいしょ、ばら、きく、カーネーション、チューリップ」の使用液量「一」を「100～300L/10a」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンネブを含む農薬の総使用回数
みかん	小黑点病 黒点病	600～800倍	200～ 700L/10a	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内
かんきつ (みかんを除く)				収穫90日前まで			
りんご	黒点病	400～650倍	200～ 700L/10a	収穫30日前まで	1回		1回
なし	赤星病			3回以内	2回以内		2回以内
かき	落葉病 炭疽病	400～650倍	200～ 700L/10a	収穫45日前まで			
ばれいしょ	疫病	500倍	100～ 300L/10a	収穫14日前まで	7回以内		7回以内
とうき	べと病	600倍	100L/10a		4回以内		4回以内
ばら きく カーネーション	灰色かび病 炭疽病 べと病 さび病	400～650倍	100～ 300L/10a	発病初期	8回以内		8回以内
チューリップ	褐色斑点病	500倍					

【注意事項の変更等について】

当該適用拡大に伴う注意事項の変更等はありません。

なお、使用にあたっては製品に貼付されているラベルを参照して下さい。



本	社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588			
東	京	本	社	〒110-0005	東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL:(03)3845-7951	
大	阪	営	業	所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F	TEL:(06)6305-5871
東	京	営	業	部	〒366-0032	埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL:(048)551-2122