

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイオーソサイド水和剤 80

キャプタン水和剤

登録番号：農林水産省登録第 11508 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：キャプタン・・・・・・・・・・80.0%（FRACコード：M04）

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「オーソサイド水和剤」は令和元年 10 月 31 日付で下記の内容で適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「ぶどう」の本剤の使用回数及びキャプタンを含む農薬の総使用回数を「2回以内」から「3回以内」に変更する。
- 作物名「せり科葉菜類（せりを除く）」（苗立枯病）を追加する。
- 作物名「トマト」、「きゅうり」、「なす」、「メロン」、「すいか」、「しろうり」、「かぼちゃ」、「ピーマン」及び「とうがらし類」の使用時期「は種後2～3葉期」を「は種後から2～3葉期まで」、使用方法「ジョウロ又は噴霧器で全面散布」を「灌注」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記す。

【注意事項の変更等について】

- 当該適用拡大に伴う注意事項の変更等はありません。
- なお、使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

本

社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャブタンを含む農薬の総使用回数
ぶどう	晩腐病 褐斑病 灰色かび病 べと病 枝膨病 黒とう病	800倍	200～ 700L/10a	収穫30日前 まで	3回以内	散布	3回以内
せり科葉菜類 (せりを除く)	苗立枯病	800倍	2L/m ²	は種後から 2～3葉期 まで	2回以内	灌注	3回以内 (種子粉衣は 1回以内、は種 後は2回以内)
トマト きゅうり なす メロン すいか しろうり かぼちゃ					5回以内		5回以内 (種子粉衣は 1回以内)
ピーマン					2回以内		2回以内 (種子粉衣は 1回以内)
とうがらし類					2回以内		3回以内 (種子粉衣は 1回以内、は種 後は2回以内)