

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ST ダコニール 1000

TPN 水和剤

登録番号：農林水産省登録第 21759 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：TPN・・・40.0%（FRACコード：**M05**）

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：宮崎県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ST ダコニール 1000」は令和元年 12 月 18 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「きゅうり」、適用病害虫名「べと病」に希釈倍数「33 倍」、使用液量「10L/10a」、使用方法「常温煙霧」を追加する。
- 作物名「きゅうり」の TPN を含む農薬の総使用回数を「10 回以内（土壌灌注は 2 回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計 8 回以内）」から「10 回以内（土壌灌注は 2 回以内、散布及び常温煙霧及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計 8 回以内）」に変更する。
- 作物名「なす」、適用病害虫名「うどんこ病」に希釈倍数「33 倍」、使用液量「10L/10a」、使用方法「常温煙霧」を追加する。
- 作物名「トマト、ミニトマト」に適用病害虫名「褐色輪紋病」を追加する。
- 作物名「てんさい」の使用時期「収穫 45 日前まで」を「収穫 30 日前まで」に変更する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
きゅうり	べと病 炭疽病 うどんこ病 灰色かび病 黒星病 褐斑病	1000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	8回以内	散布	10回以内 （土壌灌注は2回以内、散布及び常温煙霧及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内）
トマト	疫病 輪紋病 葉かび病 炭疽病 灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 <b>褐色輪紋病</b>						6回以内 （土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内）
ミニトマト	疫病 輪紋病 葉かび病 炭疽病 灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 斑点病 <b>褐色輪紋病</b>						2回以内
てんさい	褐斑病			収穫30日前まで	3回以内		3回以内

土壌灌注として使う場合

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
きゅうり	苗立枯病 （リゾグニア菌）	1000倍	3L/m <sup>2</sup>	は種時又は活着後 但し、定植14日後 まで	2回以内	土壌灌注	10回以内 （土壌灌注は2回以内、散布及び常温煙霧及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内）

常温煙霧として使う場合

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む 農薬の 総使用回数
きゅうり	温室、ガラス室、 ビニールハウス等 密閉できる場所	べと病	33倍	10L/10a	収穫前日まで	8回以内	常温煙霧	10回以内 (土壌灌注は 2回以内、散 布及び常温煙 霧及びくん煙 及びエアゾル剤 の噴射は合計 8回以内)
なす		うどんこ病				4回以内		4回以内

【注意事項の変更等について】

主な変更事項

【変更後】

- ・誤飲のないように注意すること。
- ・本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付かないように注意すること。  
付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- ・使用の際は農業用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。
- ・作業後は直ちに身体を洗い流し、洗顔・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- ・かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけること。

その他、常温煙霧の使用方法に関する注意事項が変更になっています。(略)

なお、ご使用の際は商品に貼付してあるラベルをご参照ください。



**サンケイ化学株式会社**

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588