

# サンケイ化学 農薬登録情報

## スタークル顆粒水溶剤

ジノテフラン水溶剤

登録番号：農林水産省登録第 20811 号（登録会社：三井化学アグロ株式会社）

有効成分：ジノテフラン・・・・・・・・・・20.0% IRACコード：**4A**

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「スタークル顆粒水溶剤」は令和2年1月29日付で下記内容の適用拡大になりました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「かぼちゃ」の適用病害虫名に「コナジラミ類」を、使用方法「散布」で追加する。
- ・作物名「さとうきび」の適用病害虫名に「サトウキビチビアザミウマ」を追加する。
- ・作物名「うり類（漬物用）」を「うり類（漬物用、ただし、とうがんを除く）」と「とうがん」に分割し、「とうがん」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名に「食用コスモス」を追加する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ）】

次ページに記載する。

#### 【注意事項の変更等について】

当該適用拡大に伴う使用上の注意事項の変更等はありません。

なお、使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照してください。



## サンケイ化学株式会社

本社 〒 8 9 1 - 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒 8 8 0 - 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ）】

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジネフランを含む農薬の総使用回数
かぼちゃ	—	アブラムシ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
		コナジラミ類						
かぼちゃ	—	アブラムシ類	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5～4.0L)当り0.5L	定植前日～定植時	1回	灌注	3回以内 (定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)
		アブラムシ類	2000倍	100～300L/10a	収穫45日前まで	3回以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)
カンシャコバネナガカメムシ								
さとうきび	—	サトウキビチビアザミウマ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
サトウキビ	—	コナジラミ類 アザミウマ類	2000～3000倍		収穫前日まで			
とうがん	—	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
とうがん	—	コナジラミ類 アザミウマ類	2000倍					
食用コスモス	—	コナジラミ類 アザミウマ類	3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内