

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイクムラス

水和硫黄剤

登録番号：農林水産省登録第21874号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：硫黄・・・79.2%（FRACコード：M02 IRACコード：UN）

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「サンケイクムラス」は令和2年3月11日付で下記の内容で適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「日本なし」を「なし」に変更する。
- ・作物名「豆類（種実）」及び「いも類」を削除する。（※従来の「豆類（種実）」及び「いも類」は「野菜類」に含まれるようになりました。）

【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む農薬の総使用回数	
果樹類	ハダニ類	300～400倍	200～700L/10a	-	-	散布	-	
いちご	うどんこ病	500～1000倍	100～300L/10a					
野菜類	ハダニ類	400倍	200～700L/10a					
なし	ニセナシサビダニ	300倍						
りんご	うどんこ病	350～450倍						
かんきつ	ミカンサビダニ	300～400倍						
かき	うどんこ病							
うめ	黒星病	400倍						
もも								
麦類		さび病 うどんこ病 赤かび病						300～500倍
ばら	うどんこ病	100～300L/10a						
きく	白さび病							
ホップ	べと病	250～500倍	200～700L/10a					
芝	さび病	300～500倍	1L/m ²					発病初期

【注意事項の変更等について】

・「使用上の注意事項」の（6）を以下の内容に変更する。

- （1）散布液調整の際には展着剤を加用し、調整後は速やかに使用すること。
- （2）石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけること。
- （3）マシン油乳剤との混用及びマシン油乳剤散布後 14 日以内の近接散布はさけること。
- （4）気温が高くなるに従って薬害を生じやすくなるので、高温ほど散布液の濃度を所定の範囲内でうすくして使用すること。なお、夏期高温時（28℃以上）の散布はさけること。
- （5）ぶどう、うり類（きゅうり、まくわうり等）など硫黄剤に弱い作物への使用はさけること。
- （6）なしに使用する場合、春期以降で葉の退色・落葉、花卉焼けが生じるおそれがあるので、発芽前までに使用すること。
- （7）本剤は蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- （8）適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

なお、使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

本 社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588
東 京 本 社	〒110-0005	東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL:(03)3845-7951
大 阪 営 業 所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ビル3F	TEL:(06)6305-5871
東 京 営 業 部	〒366-0032	埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL:(048)551-2122
九 州 北 部 営 業 所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL:(0942)81-3808
宮 崎 事 務 所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL:(0985)25-7051