

サンケイ化学 農薬登録情報

ベフトップジンフロアブル

イミノクタジン酢酸塩・チオファネートメチル水和剤

登録番号：農林水産省登録第21860号（登録会社：日本曹達株式会社）

有効成分：イミノクタジン酢酸塩・・・15.7%（FRACコード：M7）

チオファネートメチル・・・26.2%（FRACコード：1）

毒性：劇物

販売エリア：宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ベフトップジンフロアブル」は令和2年6月18日付で下記のように適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「麦類（小麦を除く）」を追加する。
- ・作物名「小麦」の使用方法「無人ヘリコプターによる散布」を「無人航空機による散布」に変更し、イミノクタジンを含む農薬の総使用回数及びチオファネートメチルを含む農薬の総使用回数について「無人ヘリ散布」を「無人航空機散布」に変更する。
- ・作物名「みかん」のチオファネートメチルを含む農薬の総使用回数について「無人ヘリ散布」を「無人航空機散布」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
麦類（小麦を除く）	赤かび病	1000倍	60～180ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内 （出穂期以降は1回以内）	散布	3回以内 （種子への処理は1回以内、散布は2回以内、出穂期以降は1回以内）	3回以内 （種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内）
		800～1000倍 250倍	25ℓ/10a					
小麦	うどんこ病	800～1000倍	60～180ℓ/10a	根雪前	3回以内 （出穂期以降は1回以内）	無人航空機による散布	4回以内 （種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内）	4回以内 （種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内）
	紅色雪腐病	750～1000倍						
	雪腐大粒菌核病	750倍						
	赤かび病	8倍	0.8ℓ/10a	収穫14日前まで				
みかん	貯蔵病害（青かび病） 貯蔵病害（緑かび病） 貯蔵病害（軸腐病） 貯蔵病害（こうじかび病） 貯蔵病害（黒腐病） 貯蔵病害（炭疽病） 貯蔵病害（白かび病） 貯蔵病害（すす斑病）	1500倍	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	8回以内 （塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内）

【使用上の注意事項の変更について】

(8) 本剤を**無人航空機**による散布に使用する場合は次の注意事項を守ること。

- ① 散布は散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
- ② 散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
- ③ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他の散布装置の十分な点検を行うこと。

【水産動植物への影響について】を以下の通り変更する。

- (2) **無人航空機**による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。

なお、使用に際しては商品に貼付してあるラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮 崎 事 務 所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051