

サンケイ化学 農薬登録情報

ディアナSC

スピネトラム水和剤

登録番号：農林水産省登録第 22910 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：スピネトラム・・・11.7% IRACコード：5

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ディアナSC」は令和2年7月8日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「つるむらさき」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」に適用病害虫名「ナカジロシタバ」を追加する。
- ・作物名「かぶ」に適用病害虫名「アオムシ」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」の使用方法「散布」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- ・作物名「こまつな」に適用病害虫名「ヨトウムシ」を追加する。
- ・作物名「チンゲンサイ」に適用病害虫名「アオムシ」「ハイマダラノメイガ」および「ヨトウムシ」を追加する。
- ・作物名「なばな類」に適用病害虫名「ハクサイダニ」を追加し、作物名「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、チンゲンサイを除く）」を「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く）」に変更する。
- ・作物名「たまねぎ」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。
- ・作物名「花き類・観葉植物（りんどうを除く）」および「りんどう」の希釈倍数「2500～5000 倍」に適用病害虫名「イラクサギンウワバ」を追加する。
- ・作物名「花き類・観葉植物（りんどうを除く）」および「りんどう」の希釈倍数「2500 倍」に適用病害虫名「クロバネキノコバエ類」を追加する。
- ・作物名「りんどう」の適用病害虫名「リンドウホソハマキ」の希釈倍数「2500 倍」を「2500～5000 倍」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記す。

【注意事項の変更について】

当該適用拡大に伴う注意事項の変更等はありません。

なお、使用の際には商品に貼付してあるラベルをご参照ください。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネラムを含む農薬の総使用回数
つるむらさき	ハスモンヨトウ	2500倍					2回以内
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ						
かぶ	コナガ ハスモンヨトウ アオムシ						
キャベツ	アザミウマ類 コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ウワバ類 オオタバコガ ハモグリバエ類	2500～5000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内 (定植時までの処理は 1回以内、 定植後の散布は2回以 内)
	アザミウマ類	50～200倍	セル成型育苗 トレイ1箱または ペーパー ポット1冊(30 ×60cm・使用 土壌約3～4 ℓ)当り0.5ℓ	育苗期後半	1回	灌注	
こまつな	コナガ ハスモンヨトウ アザミウマ類 アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ	2500～5000倍					2回以内
チンゲンサイ	コナガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ						
なばな類	コナガ ハスモンヨトウ ハクサイダニ						
たまねぎ	アザミウマ類 ネギハモグリバエ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ		100～300ℓ /10a		2回以内	散布	2回以内
花き類・観葉植物 (りんどうを除く)	アザミウマ類 オオタバコガ ハモグリバエ類 イラクサギンワバ	2500倍					2回以内
	コナジラミ類 クロバネキノコバエ類						
りんどう	アザミウマ類 オオタバコガ ハモグリバエ類 イラクサギンウワバ	2500～5000倍					2回以内
	リンドウホソハマキ	2500～5000倍					
	コナジラミ類	2500倍					
	クロバネキノコバエ類	2500倍					
非結球あぶらな科 葉菜類 (こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く)	コナガ ハスモンヨトウ	2500～5000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内