

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ベストガード粒剤

ニテンピラム粒剤

登録番号：農林水産省登録第 19103 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ニテンピラム・・・1.0% IRACコード：**4A**

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・宮崎県・熊本県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ベストガード粒剤」は令和2年7月8日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「ねぎ」の使用時期「定植時」に適用病害虫名「クロバネキノコバエ類」を追加する。
- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」の使用時期「育苗期」の適用病害虫名「アブラムシ類」の使用量「1g/株」を「1～2g/株」に変更する。
- ・作物名「ピーマン」の使用時期「定植時」に適用病害虫名「コナジラミ類」を追加する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

#### 【注意事項等の変更】

- ・当該適用拡大に伴う注意事項等の変更はありません。
- ・なお、ご使用の際は商品に貼付してあるラベルをご参照ください。



## サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ニテンピラムを含む農薬の総使用回数	
ねぎ	ネギハモグリバエ ネギアザミウマ	5g/培土ℓ	は種時	1回	育苗培土混和	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、株元処理及び水溶剤の散布は合計3回以内)	
	ネギアザミウマ	6kg/10a			作条処理 土壌混和		
		セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3~4ℓ)当り50g	定植当日		散布		
	<b>クロバネキノコバエ類</b>	6kg/10a	定植時		3回以内		植溝処理 土壌混和
	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ						収穫前日まで
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類	5g/培土ℓ	は種時又は鉢上げ時	1回	育苗培土混和	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、水溶剤の散布は3回以内)	
		<b>1~2g/株</b>	育苗期		株元処理		
	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約3~4ℓ)当り50g	育苗期後半		散布		
	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和		
	ハモグリバエ類	2g/株					
ピーマン	アブラムシ類 コナジラミ類	1g/株	育苗期	1回	株元処理	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内)	
	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ	1~2g/株	定植時		植穴処理 土壌混和		
	<b>コナジラミ類</b>						