

サンケイ化学 農薬登録情報

アグレプト液剤

ストレプトマイシン液剤

登録番号：農林水産省登録第 13823 号（登録会社：Meiji Seika ファルマ株式会社）

有効成分：ストレプトマイシン硫酸塩・・・25.0%

（ストレプトマイシンとして・・・20.0%） FRACコード：**25**

毒性：普通物（毒物、劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品「アグレプト液剤」は令和3年1月13日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「レタス」を追加する。
- ・作物名「ばれいしょ」、適用病害虫名「そうか病」、使用方法「5～10秒間種いも浸漬」の希釈倍数を「60～100倍」に変更する。
- ・作物名「ばれいしょ」、適用病害虫名「黒あし病」の希釈倍数「100倍」を「60～100倍」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に関わる作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数	
レタス	腐敗病	2000倍	100～300ℓ /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	
ばれいしょ	軟腐病	1000～2000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内 (種いもへの処理は1回以内)	
	そうか病	10倍	200～300mℓ /種いも100kg	植付前	1回	種いも散布		5～10秒間 種いも浸漬
		60～100倍	—			種いも散布		
	黒あし病	10倍	2.5～3ℓ /種いも100kg			3ℓ /種いも100kg		種いも散布
		60～100倍	—					5～10秒間 種いも浸漬
			—					—

【注意事項等の変更について】

当該適用拡大に伴う使用上の注意事項等の変更はありません。

なお、使用の際は商品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社