

サンケイ化学 農薬登録情報

ダントツ粒剤

クロチアニジン粒剤

登録番号：農林水産省登録第 20800 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：クロチアニジン・・・0.50% （IRACコード：**4A**）

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ダントツ粒剤」は令和 3 年 2 月 10 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「あずき」を追加する。
- ・作物名「えだまめ」を追加する。
- ・作物名「レタス」に使用方法「植穴処理土壌混和」を追加する。
- ・作物名「レタス」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）」を「5回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「非結球レタス」に使用方法「セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する」を追加する。
- ・作物名「非結球レタス」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内（育苗期の株元処理は1回以内、散布は2回以内）」を「5回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「みずな」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内」を「4回以内（は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「はくさい」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）」を「5回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内）」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

- ・次ページに記載する。

【使用上の注意事項等の変更】

- ・当該適用拡大に伴う使用上の注意事項等の変更はありません。
- ・なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照ください。

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	
あずき	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	播溝処理 土壌混和	4回以内 (は種時の処理は 1回以内、 は種後は3回以内)	
えだまめ			定植時		植穴処理 土壌混和		
レタス		2g/株	育苗期後半		セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5~4ℓ) 当り50g	株元処理	5回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内)
		0.5g/株				セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する	
		0.5g/株				セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する	
非結球レタス	0.5g/株	株元処理	5回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内)				
みずな	6kg/10a	は種時	播溝処理 土壌混和	4回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)			
はくさい	アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	0.25g/株	は種時	覆土後セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する	5回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内)		
	コナガ アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ ネキリムシ類	0.5g/株	育苗期後半	株元処理			
	アブラムシ類 ハイマダラノメイガ	1~2g/株	定植時	植穴処理 土壌混和			
	コナガ アオムシ	2g/株					



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL:(099)268-7588
 宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル TEL:(0985)25-7051