

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイ スミチオン乳剤

MEP 乳剤

登録番号：農林水産省登録第 5052 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：MEP・・・50.0% I R A C J-D：1B

毒性：普通物（毒物・劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：九州全県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「サンケイ スミチオン乳剤」が令和 3 年 4 月 7 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「さくら」を追加する。
- ・作物名「ほうれんそう」の適用病害虫名「ホウレンソウケナガコナダニ」の希釈倍数「2000 倍」を「1000～2000 倍」に変更する。
- ・作物名「もも」および「うめ」の希釈倍数「1000 倍」に適用病害虫名「クビアカツヤカミキリ」を追加する。
- ・作物名「さかき」に適用病害虫名「サカキブチヒメヨコバイ」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大の作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEP を含む農薬の 総使用回数
さくら	クビアカツヤカミキリ	1000倍	200～700g /10a	成虫発生初期	6回以内	散布	6回以内
ほうれんそう	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300g /10a	収穫21日前まで	2回以内		2回以内
	ホウレンソウケナガコナダニ	1000～2000倍					2回以内
もも	アブラムシ類 モモハモグリガ ナシヒメシンクイ(心折防止)	1000～2000倍	200～700g /10a	収穫3日前まで	6回以内		6回以内 (樹幹処理は 1回以内)
	ナシヒメシンクイ モモシンクイガ ハマキムシ類 クワシロカイガラムシ カメムシ類	1000倍		成虫発生初期 但し、 収穫3日前まで 収穫3日前まで			
	クビアカツヤカミキリ						
	クワコナカイガラムシ	1500倍					
うめ	アブラムシ類	1000～2000倍	200～700g /10a	収穫14日前まで	2回以内		2回以内
	アメリカシロヒトリ ハマキムシ類	1000倍		成虫発生初期 但し、 収穫14日前まで			
	クビアカツヤカミキリ						
さかき	ハマキムシ類	1000倍	200～700g /10a	—	6回以内	6回以内	
	サカキブチヒメヨコバイ						

【使用上の注意事項の変更等について】

- ・当該適用拡大に伴う注意事項等の変更はありません。
- ・なお、使用にあたっては製品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

本社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL:(0942)81-3808
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL:(0985)25-7051