

サンケイ化学 農薬登録情報

カジランSフロアブル

水和硫黄剤

登録番号：農林水産省登録第 24242 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：硫黄・・・・・・・・・・30.0% IRACコード：UN

毒性：普通物（毒物・劇物でないものを指している通称）

販売エリア：全国

適用拡大登録のお知らせ

弊社登録製品「カジランSフロアブル」は令和3年6月23日付で下記の内容を適用拡大登録いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の内容】

- ・作物名「ひのき」の使用目的「カモシカ、ニホンジカによる食害防止」を「ニホンジカによる食害防止」に変更し、作物名「樹木類」を使用目的「カモシカによる食害防止」として追加する。
- ・作物名「すぎ」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法】

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む農薬の総使用回数
樹木類	カモシカによる食害防止	10倍	10~50mL/樹	食害発生前	—	散布	—
ひのき	ニホンジカによる食害防止						
すぎ							

【使用上の注意事項等の変更】

使用上の注意事項に以下の赤字の項目を追加する。

- （1） 使用する前には容器を良く振ること。
- （2） 使用する前に所定量を所定量の水に希釈し、良くかき混ぜてから散布すること。
- （3） 散布液量は樹木の樹高によって増減させ、特に樹木の食害が予測される箇所に重点的に散布すること。
- （4） 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- （5） 夏季の高温時における散布は、薬害発生のおそれがあるためさけること。
- （6） 散布直後の降雨または強風時の散布は効果が劣ることがあるので、天候を良く見極めてから散布すること。
- （7） 散布に使用した器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は必ず回収し、環境に影響を与えないよう適切に処理すること。

- (8) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は林業関係機関、林業技術者等の指導を受けること。
- (9) 適用作物群に属する作物又は新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、林業関係機関、林業技術者等の指導を受けることが望ましい。

なお、使用に際しては製品に貼付されているラベルを参照してください。



本 社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588
東 京 本 社	〒110-0005	東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL:(03)3845-7951
大 阪 営 業 所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F	TEL:(06)6305-5871
東 京 営 業 部	〒366-0032	埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL:(048)551-2122
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL:(0942)81-3808
宮 崎 事 務 所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL:(0985)25-7051