

サンケイ化学 農薬登録情報

バリダシン液剤5

バリダマイシン液剤

登録番号：農林水産省登録第 17386 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：バリダマイシンA・・・5.0% FRACコード：U18

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・宮崎県・熊本県

適用拡大登録のお知らせ

弊社取扱い製品「バリダシン液剤5」が令和3年8月31日付で下記内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「未成熟とうもろこし」、「ブロッコリー」、「うめ」を追加する。
- ・作物名「だいこん」の使用時期を「収穫21日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- ・作物名「レタス」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名「非結球レタス」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫3日前まで」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」のバリダマイシンを含む農薬の総使用回数を「2回以内（は種時の灌注は1回以内、散布及び株元散布は合計1回以内）」から「3回以内（は種時の灌注は1回以内、散布及び株元散布は合計2回以内）」に変更し、希釈倍数「500倍」の使用時期を「収穫21日前まで」から「収穫前日まで」、本剤の使用回数を「1回」から「2回以内」に変更する。
- ・作物名「にんにく」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫3日前まで」に変更する。
- ・作物名「みつば」の使用時期を「移植後 但し 収穫21日前まで、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで」から「移植後 但し 収穫7日前まで、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで」に変更する。
- ・作物名「かんきつ」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- ・作物名「すもも」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫3日前まで」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

- ・次ページに記載する。

【使用上の注意事項等の変更】

【変更後】

- ・うめ、かんきつのかいよう病に対しては効果がやや劣る場合があるので、他剤と輪番使用をするとより有効である。
- ・なお、ご使用の際には製品に貼付してあるラベルをご一読ください。

※現在販売はしていませんが、弊社登録のサンケイバリダシン液剤5（登録番号：17388）につきましても同内容の適用拡大をいたしました。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数
未成熟とうもろこし	紋枯病	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
ブロッコリー	黒腐病	800倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
うめ	かいよう病	500倍	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
だいこん	軟腐病	500倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
ねぎ	苗立枯病(リゾニア菌)	400倍	6ℓ/m ²	は種時	1回	灌注	3回以内 (は種時の灌注は1回以内、散布及び株元散布は合計2回以内)
	軟腐病	500倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	
	白絹病					株元散布	
レタス	すそ枯病 腐敗病 軟腐病	800倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
非結球レタス				収穫3日前まで			
にんにく	春腐病	800倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	5回以内	散布	5回以内
みつば	立枯病	800倍	100～300ℓ/10a	育苗期	1回	散布	4回以内 (育苗期は1回以内、移植後は3回以内)
				移植後 但し 収穫7日前まで、 伏せ込み栽培は 伏せ込み前まで	3回以内		
かんきつ	かいよう病	500倍	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
すもも	黒斑病	500倍	200～700ℓ/10a	収穫3日前まで	4回以内	散布	4回以内



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮 崎 事 務 所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051