

サンケイ化学 農薬登録情報

バイオセーフ

スタイナーネマ カーポカプサ工剤

登録番号：農林水産省登録第 21503 号（登録会社：株式会社I・D・I バイotech）

有効成分：スタイナーネマ カーポカプサ オール株（感染態3期幼虫）・・・250万頭/g

IRACコード：一（生）

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：九州全県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「バイオセーフ」は令和3年10月13日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「かんきつ」、適用病害虫名「ゴマダラカミキリ幼虫」及び使用方法「木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで樹幹注入」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スタイナーネマカーポカプサを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ゴマダラカミキリ幼虫	2500万頭 (約10g)	2.5ℓ	幼虫発生期	—	木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで樹幹注入	—

【使用上の注意事項の変更等について】

以下の注意事項を変更する。

【変更事項】変更部分を赤字で示しております。

- 芝、花き類・観葉植物、**野菜類**、果樹類に使用する場合は薬液の調製は、以下のとおり行うこと。
1㎡ 当り 0.5ℓ～2ℓ 処理する場合、2500万頭(約10g)を50ℓ～200ℓの水に希釈すること。
- 本剤を**野菜類**、花き類・観葉植物の土壌灌注で使用する場合には、以下の点にも留意すること。
 - ① 本剤をハスモンヨトウに使用する場合は老令幼虫防除を目的とし、灌水チューブあるいは手灌注により株元に処理すること。
 - ② 灌水チューブの種類（フィルター等）によっては、線虫が通り抜けられない場合があるので注意すること。

- ③ 手灌注する場合、薬液が葉に付着すると汚れが残るので、葉にかからないように株元に灌注する。葉に付着した場合、薬液が乾燥する前に散水し洗い流すこと。
- 本剤をクビアカツヤカミキリ幼虫及びゴマダラカミキリに使用する場合は、予め、木屑排出孔の木屑を水で洗浄除去し、隣接する排出孔から溢れ出すまで十分量を注入すること。処理は小雨時に行うこと。晴天時の処理はさけること。

以上



本 社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9	TEL:(099)268-7588
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL:(0942)81-3808
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL:(0985)25-7051