

サンケイ化学 農薬登録情報

ダントツ水溶剤

クロチアニジン水溶剤

登録番号：農林水産省登録第 20798 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：クロチアニジン・・・16.0% （IRACコード：4A）

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品「ダントツ水溶剤」は令和3年10月27日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「稲（箱育苗）」の適用病害虫名「ウンカ類、ツマグロヨコバイ、フタオビコヤガ」に希釈倍数「高密度には種する場合は50g/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5ℓ）1箱当り2.5～5g（希釈倍数100～200倍）」を追加する。
- 作物名「稲（箱育苗）」の適用病害虫名「イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ」に希釈倍数「高密度には種する場合は50g/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5ℓ）1箱当り1.25～5g（希釈倍数100～400倍）」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
稲 （箱育苗）	ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ	200倍	育苗箱 （30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ） 1箱当り 500ml	移植3日前 ～移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に 散布する。	4回以内 （移植時までの 処理は1回以 内、本田での散 布、空中散布、 無人航空機 散布は合計 3回以内）
		高密度に は種する場合は 50g/10a （育苗箱 30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ） 1箱当り 2.5～5g （希釈倍数 100～200倍）					
	イネドロオイムシ イネミズゾウムシ	200～400倍					
		高密度に は種する場合は 50g/10a （育苗箱 30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ） 1箱当り 1.25～5g （希釈倍数 100～400倍）					

【使用上の注意事項の変更等】

○追加事項

- 育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5ℓ）1箱当りに乾糞として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が50g/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を1.25～5gまでの範囲で調整すること。
- なお、ご使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照して下さい。



本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051