

サンケイ化学 農薬登録情報

スタークル液剤 10

ジノテフラン液剤

登録番号：農林水産省登録第 21259 号（登録会社：三井化学アグロ株式会社）

有効成分：ジノテフラン・・・10.0% IRACコード：**4A**

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「スタークル液剤 10」は令和 3 年 12 月 22 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・ 作物名「だいこん」を追加する。
- ・ 作物名「キャベツ」を追加する。
- ・ 作物名「ブロッコリー」を追加する。
- ・ 作物名「ねぎ」を追加する。
- ・ 作物名「さとうきび」の使用時期「収穫 45 日前まで」を「収穫 7 日前まで」に変更する。
- ・ 作物名「だいず」及び「えだまめ」の適用病害虫名「フタスジヒメハムシ」に使用方法「無人航空機による散布」及び「空中散布」を追加する。
- ・ 作物名「だいず」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3 回以内（は種時の土壌混和は 1 回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計 2 回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「えだまめ」のジノテフランを含む農薬の総使用回数を「3 回以内（は種時の土壌混和は 1 回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計 2 回以内）」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に関わる作物のみ記載）】

- ・ 次ページに記載する。

【注意事項の変更について】

- ・ 本剤を空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ること。

散布にあたっては、散布機種に適合した散布装置を使用すること。

なお、使用の際は商品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に関わる作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメフランを含む農薬の総使用回数
だいこん	アブラムシ類	8～16倍	1.6ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	5回以内 （は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内）
キャベツ				収穫3日前まで			3回以内 （育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌水は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内）
ブロッコリー	アザミウマ類	10～16倍	1.6ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	無人航空機による散布	3回以内 （定植時の土壌混和及び灌水は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内）
ねぎ							4回以内 （は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌水及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌水は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内）
さとうきび	カンシヤコバナナガカメムシ	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	5回以内 （粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内）
	イナゴ類	14倍	2.4ℓ/10a			無人航空機による散布	
だいず	カメムシ類 ダイズサヤタマバエ フタスジヒメハムシ	1000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内 （は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内）
	カメムシ類 ダイズサヤタマバエ フタスジヒメハムシ	8倍	0.8ℓ/10a			無人航空機による散布	
えだまめ	カメムシ類 ダイズサヤタマバエ フタスジヒメハムシ	1000倍	100～300ℓ/10a			空中散布	
	カメムシ類 ダイズサヤタマバエ フタスジヒメハムシ	8倍	0.8ℓ/10a			散布	
						無人航空機による散布	3回以内 （は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内）
						空中散布	