

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ベフトップジンフロアブル

イミノクタジン酢酸塩・チオファネートメチル水和剤

登録番号：農林水産省登録第21860号（登録会社：日本曹達株式会社）

有効成分：イミノクタジン酢酸塩・・・15.7% 殺菌剤分類：M7

チオファネートメチル・・・26.2% 殺菌剤分類：1

毒性：劇物

販売エリア：宮崎県・鹿児島県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「ベフトップジンフロアブル」は令和4年2月9日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「かんきつ（みかんを除く）」及び「みかん」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「かんきつ（みかんを除く）」及び「みかん」に適用病害名「貯蔵病害（黒斑病）」を追加する。
- ・作物名「小麦」に適用病害名「葉枯症」及び「赤さび病」を追加する。
- ・作物名「小麦」の適用病害名「雪腐大粒菌核病」の希釈倍数を「750倍」から「750～1000倍」に変更する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	チオファネートメチルを含む農薬の総使用回数
小麦	うどんこ病 葉枯症 赤さび病	800～1000倍	60～180ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内 (出穂期以降は1回以内)	散布	4回以内 (種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内)	4回以内 (種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内)
	赤かび病	250倍	25ℓ/10a					
	紅色雪腐病 雪腐大粒菌核病	750～1000倍	60～180ℓ/10a	根雪前				
	赤かび病	8倍	0.8ℓ/10a	収穫14日前まで		無人航空機による散布		
みかん	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(こうじかび病)	1500倍	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	8回以内 (塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内)
	貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(白かび病) 貯蔵病害(すす斑病) 貯蔵病害(黒斑病)	25倍	8ℓ/10a			無人航空機による散布		
かんきつ (みかんを除く)		1500倍	200～700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	8回以内 (塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内)

## 【使用上の注意事項の変更について】

- 使用上の注意事項を以下のとおり変更する。
  - (4)ボルドー液とは沈殿を**生じる**ので混用しないこと。塩化銅等の無機銅剤との混用はさけること。
  - (5)日本なし、もも、うめ等の果実、稲、きゅうり、あぶらな科作物、まめ類には、葉に薬害を**生じる**ことがあるのでかからないように注意して散布すること。
  - (6)かんきつの施設栽培で果実の着色終了前に使用する場合、果実に着色むらを生じるおそれがあるので、降雨時等の極端な多湿条件下での散布は**さける**こと。
- なお、使用に際しては商品に貼付してあるラベルを参照してください。



# サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮 崎 事 務 所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051