

サンケイ化学 農薬登録情報

スタークル粒剤

登録番号：農林水産省登録 第20805号（登録会社：三井化学アグロ（株））
有効成分：ジノテフラン・・・・・・1.0%

毒性：普通物(毒劇物に該当しない物を指している通称)
販売エリア：九州

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『スタークル粒剤』が平成26年8月27日付けで下記のように適用拡大されました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- 作物名「だいこん」の「ジノテフランを含む農薬の総使用回数」を「5回以内(播種時の粒剤の播溝土壌混和は1回以内、播種時の粒剤の全面土壌混和は1回以内、生育期の粒剤の散布は1回以内、生育期の水溶剤の散布は2回以内)」から「5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計2回以内)」に変更。
- 作物名「ズッキーニ」の適用病害虫名「アブラムシ類」使用方法「株元散布」を追加し、「ジノテフランを含む農薬の総使用回数」を「3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)」から「4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)」に変更。
- 作物名「ふき」の「ジノテフランを含む農薬の総使用回数」を「3回以内(粒剤は1回以内、水溶剤は2回以内)」から「3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)」に変更。
- 作物名「セルリー」の追加。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物の

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
だいこん	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計2回以内)
	キスジ/ハマシ	4~6kg/10a				
		9~12kg/10a				
		6kg/10a	生育期但し、収穫30日前まで	散布		
ズッキーニ	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
	コナジラミ類					
	アブラムシ類	1g/株	生育期但し、収穫14日前まで		株元散布	
ふき	アブラムシ類	20kg/10a	定植後~生育期(草丈20cm頃まで)但し、収穫45日前まで	1回	土壌表面散布	3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)
セルリー	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)

<注意事項について>

変更なし

使用上の注意事項については製品に貼付のラベルをご参照下さい。



本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951
深谷 技術普及部 TEL:048-551-2122