

サンケイ化学 農薬登録情報

オーケストラフロアブル

ベンズピリモキサン水和剤

登録番号：農林水産省登録第 24424 号（登録会社：日本農薬株式会社）

有効成分：ベンズピリモキサン・・・10.0% 殺虫剤分類：UN

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「オーケストラフロアブル」は令和 4 年 11 月 9 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「稲」の使用方法に「空中散布」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンズピリモキサンを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類幼虫 ツマグロヨコバイ幼虫	1000倍	60~150ℓ/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
		200倍	25ℓ/10a				
		16倍	1.6ℓ/10a				
		8倍	0.8ℓ/10a				
		30倍	3ℓ/10a				

【注意事項の変更について】

○農薬の使用上の注意事項を以下のように変更ならびに追加する。

- (4) 空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ること。
- (5) 空中散布に当たっては、散布後少なくとも翌日まで、落水及びかけ流しを行わないこと。

○水産動植物に有害な農薬については、その旨、を以下のように変更する。

- (2) 空中散布または無人航空機による散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意すること。

7 農薬の使用上の注意事項

- (1) 本剤は成虫を直接殺す作用がないので、幼虫主体の時期に散布するのが望ましい。また、その場合、薬剤散布後も幼虫は直ちに死亡せず、死亡までに数日を要するので十分留意すること。
- (2) 成虫の防除を必要とする場合には、成虫に有効な薬剤と組み合わせて使用すること。
- (3) 本剤を希釈倍数 200 倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式

地上液剤散布装置を使用すること。

(4) 空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ること。

- ① 散布液調製後はできるだけ速やかに散布すること。
- ② 散布は各散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
- ③ 散布機種に適合した散布装置を使用すること。
- ④ 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
- ⑤ 散布薬液の飛散によって動植物及び自動車の塗装やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
- ⑥ 散布終了後は次の事項を守ること。
 - a. 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理すること。
 - b. 機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。

(5) 空中散布に当たっては、散布後少なくとも翌日まで、落水及びかけ流しを行わないこと。

(6) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

9 水産動植物に有毒な農薬については、その旨

- (1) 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。
- (2) 空中散布または無人航空機による散布で使用する場合は、河川、養殖池に飛散しないよう特に注意すること。

なお、ご使用の際は商品に貼付しているラベルをご一読ください。

