

サンケイ化学 農薬登録情報

ベンレート水和剤

ベノミル水和剤

登録番号：農林水産省登録第 20889 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ベノミル・・・・・・・・・・50.0% 殺菌剤分類：

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録のお知らせ

弊社取扱い商品「ベンレート水和剤」は令和 5 年 1 月 25 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「せんぶり」および「とりかぶと（薬用）」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」の適用病害虫名「いもち病」、希釈倍数または使用量「500～1000 倍」の使用時期「は種時～は種 7 日後頃」を「は種時～は種 14 日後まで」に変更する。
- ・作物名「ブロッコリー」に適用病害虫名「根朽病」、希釈倍数「2000 倍」を追加する。
- ・作物名「ズッキーニ」に適用病害虫名「つる枯病」を追加する。
- ・作物名「うど」の使用時期「種株冷蔵保存前」を「定植前」に変更する。
- ・作物名「しゃくやく（薬用）」の適用病害虫名「灰色かび病」の本剤の使用回数「8 回以内」を「10 回以内（1 年間に 2 回以内）」に変更し、ベノミルを含む農薬の総使用回数「9 回以内（植付前までの処理は 1 回以内、植付後は 8 回以内）」を「11 回以内（植付前までの処理は 1 回以内、植付後は 10 回以内（但し、1 年間に 2 回以内）」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記す。

【使用上の注意事項等の変更について】

●追加事項

- ・なしの胴枯病・枝枯病に対してマシン油乳剤で希釈して塗布を行う場合、マシン油乳剤はベンレート水和剤に加用の登録のある剤を使用し、マシン油乳剤の注意事項を確認のうえ使用すること。

なお、使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 または 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ベノミルを 含む農薬の 総使用回数
せんぶり	さび病	2000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	12回以内 (1年間に 6回以内)	散布	12回以内 (1年間に 6回以内)
とりかぶと (薬用)	白絹病	種いも重量の 0.4%	—	植付前	1回	種いも粉衣	1回
稲(箱育苗)	いもち病	育苗箱 (30×60×3cm 使用土壌約5ℓ) 1箱当り1g	—	は種前	1回	床土混和	2回以内 (種子への 処理は 1回以内、 床土への 混和は 1回以内)
		1000倍	育苗箱 (30×60×3cm 使用土壌約5ℓ) 1箱当り1ℓ	は種時～ は種7日後頃	2回以内		
	500～1000倍	育苗箱 (30×60×3cm 使用土壌約5ℓ) 1箱当り500mℓ	は種時～ は種14日後 まで	2回以内		灌注	
			は種時				
苗立枯病 (フザリウム菌)	1000倍	育苗箱 (30×60×3cm 使用土壌約5ℓ) 1箱当り1ℓ	は種時1回 又は は種時とは種 7日後頃の2回				
ブロッコリー	根朽病	2000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 (種子粉衣は 1回以内、 は種後は 3回以内)
	菌核病	2000～4000倍					
ズッキーニ	菌核病	3000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (種子粉衣は 1回以内、 は種後は 3回以内)
	つる枯病						
うど	菌核病	500倍	—	定植前	1回	30分間 種株浸漬	1回
しゃくやく (薬用)	根黒斑病	20倍	—	植付前	1回	10分間 苗基部浸漬	11回以内 (植付前ま での処理は 1回以内、 植付後は 10回以内 (但し、1年 間に2回以 内))
		500倍				16時間 苗基部浸漬	
	灰色かび病	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫14日前 まで	10回以内 (1年間に 2回以内)	散布	