

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ディアナSC

スピネトラム水和剤

登録番号：農林水産省登録第 22910 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：スピネトラム・・・11.7% 殺虫剤分類：5

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ディアナSC」は令和5年3月8日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「とうがん」を追加する。
- 作物名「かんしょ」に適用病害虫名「ヒルガオハモグリガ」を追加する。
- 作物名「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く）」、「チンゲンサイ」および「なばな類」に適用病害虫名「アザミウマ類」を追加する。
- 作物名「ブロッコリー」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。
- 作物名「しゅんぎく」に適用病害虫名「アザミウマ類」を追加する。
- 作物名「らっきょう」の使用方法「散布」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- 作物名「セルリー」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- 作物名「すいか」の希釈倍数「2500～5000倍」に適用病害虫名「ハスモンヨトウ」を追加する。
- 作物名「ほうれんそう」の希釈倍数「2500～5000倍」に適用病害虫名「アザミウマ類」を追加する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記す。

#### 【注意事項の変更について】

当該適用拡大に伴う使用上の注意事項の変更等はありません。

なお、ご使用の際には商品に貼付してあるラベルをご参照ください。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数
とうがん	アザミウマ類	2500倍	100~300 ℓ/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
かんしょ	ナカジロシタバ ハスモンヨトウ	2500~5000倍					
	ヒルガオハモグリガ	2500倍					
非結球あぶらな科 葉菜類 (こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く)	アザミウマ類	2500~5000倍					
	コナガ ハスモンヨトウ						
チンゲンサイ	アザミウマ類 ハモグリバエ類 アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ						
	アザミウマ類 コナガ ハクサイダニ ハスモンヨトウ						
	アザミウマ類 ウワバ類 アオムシ オオタバコガ コナガ						
	シロイチモジヨトウ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ						
なばな類	アザミウマ類 コナガ ハクサイダニ ハスモンヨトウ						
ブロッコリー	アザミウマ類 ウワバ類 アオムシ オオタバコガ コナガ						
	シロイチモジヨトウ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ						
しゅんぎく	アザミウマ類 ハモグリバエ類 オオタバコガ ハクサイダニ ハスモンヨトウ						
らっきょう	ネダニ類	2500倍	—	植付前	1回	30分間 種球浸漬	3回以内 (種球浸漬は 1回以内、 散布は 2回以内)
	アザミウマ類	2500~5000倍	100~300 ℓ/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
セルリー	ハモグリバエ類						
	ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ						
すいか	コナジラミ類	2500倍					
	アザミウマ類 ウリノメイガ オオタバコガ	2500~5000倍					
	ハスモンヨトウ	2500倍					
	ハウレンソウケナガコナダニ						
ほうれんそう	アザミウマ類	2500~5000倍					
	ハモグリバエ類 シロオビノメイガ ハクサイダニ ハスモンヨトウ						



# サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮 崎 事 務 所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051

