

# サンケイ化学 農薬登録情報

## クミアイダコニール 1000

TPN 水和剤

登録番号：農林水産省登録第 16824 号（登録会社：クミアイ化学工業株式会社）

有効成分：TPN・・・40.0% 殺菌剤分類：**M5**

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品「クミアイダコニール 1000」は令和 5 年 3 月 8 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「トマト」に、適用病害虫名「斑点病」を追加する。
- 作物名「トマト」に、適用病害虫名「うどんこ病」、希釈倍数「33 倍」、使用液量「10ℓ/10a」、使用時期「収穫前日まで」、本剤の使用回数「4 回以内」、使用方法「常温煙霧」、TPN を含む農薬の総使用回数を「6 回以内（土壌灌注は 2 回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計 4 回以内）」を追加する。
- 作物名「せんぶり」、適用病害虫名「さび病」、希釈倍数「1000 倍」、使用液量「100～300ℓ/10a」、使用時期「収穫 7 日前まで」、本剤の使用回数「12 回以内（1 年間に 6 回以内）」、使用方法「散布」、TPN を含む農薬の総使用回数「12 回以内（1 年間に 6 回以内）」を追加する。
- 作物名「にんじん」に、希釈倍数「8 倍」、使用液量「1.6ℓ/10a」、使用時期「収穫 7 日前まで」、本剤の使用回数「5 回以内」、使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- 作物名「にんじん」に、希釈倍数「16 倍」、使用液量「3.2ℓ/10a」、使用時期「収穫 7 日前まで」、本剤の使用回数「5 回以内」、使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

- 次ページに記載する。

#### 【使用上の注意事項等の変更】

- 当該適用拡大に伴う使用上の注意事項等の変更はありません。
- なお、ご使用の際は商品に貼付してあるラベルをご参照ください。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
トマト	疫病 輪紋病 葉かび病 炭疽病 灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 褐色輪紋病	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	6回以内 （土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内）
	斑点病						
せんぶり	さび病	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫7日前まで	12回以内 （1年間に6回以内）	散布	12回以内 （1年間に6回以内）
にんじん	黒葉枯病	1000倍	100～300 ℓ/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内 （種子への吹き付け処理は1回以内）
		8倍	1.6ℓ/10a	収穫7日前まで		無人航空機による散布	
		16倍	3.2ℓ/10a				

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
トマト	温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所	すすかび病	33倍	10ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内	常温煙霧	6回以内 （土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内）
		葉かび病						
		褐色輪紋病						
		うどんこ病						



サンケイ化学株式会社