

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイダブルシューターSE

脂肪酸グリセリド・スピノサド水和剤

登録番号：農林水産省登録第 24054 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：脂肪酸グリセリド・・・75.0% 殺虫剤分類：—

スピノサド・・・・・・・・ 5.0% 殺虫剤分類：5

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：全国

適用拡大登録のお知らせ

弊社登録製品「サンケイダブルシューターSE」は令和5年12月20日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「アスパラガス」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」を「鱗茎類（葉物、ただし、にら、にら（花茎）を除く）」、作物名「ピーマン」を「ピーマン及びとうがらし類」に変更する。
- ・作物名「花き類・観葉植物」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」、作物名「すいか」に適用病害虫名「コナジラミ類、オオタバコガ」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	脂肪酸グリセリドを含む農薬の総使用回数	スピノサドを含む農薬の総使用回数	
鱗茎類 (葉物、ただし、 にら、にら(花 茎)を除く)	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ	1000倍	100～ 300L /10a	収穫3日前 まで	3回以内	散布	—	3回以内	
ピーマン 及び とうがらし類	ハダニ類 コナジラミ類 アザミウマ類 オオタバコガ			収穫前日 まで	2回以内			2回以内	2回以内
すいか	ハダニ類 コナジラミ類 アザミウマ類 オオタバコガ								
アスパラガス	ハダニ類 アザミウマ類								
花き類・ 観葉植物	ハダニ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類			発生初期					

【使用上の注意事項の変更】

・使用上の注意事項に（9）として赤字部分を追加し、下記のとおりとする。

【変更後】

・使用上の注意事項

- （1）使用直前に容器をよく振ること。
- （2）使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- （3）散布の際は、葉裏等に散布むらを生じないように丁寧に散布すること。
- （4）キャプタンを含む農薬またはアゾキシストロピンを含む農薬との同時施用もしくは近接散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけること。
- （5）花き類・観葉植物に使用する場合は、品種、栽培条件等により花卉、苞、葉に薬害を生じる場合があるので、事前に安全を確認して使用すること。特に結蕾期以降の散布は注意すること。
- （6）蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれがある場所では使用しないこと。
- （7）ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
 - ② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等での使用をさけること。
 - ③ 関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- （8）使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。
特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- （9）適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

・なお、ご使用にあたっては製品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



本 社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9番地	TEL：(099)268-7588
東 京 本 社	〒110-0005	東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL：(03)3845-7951
大 阪 営 業 所	〒532-0011	大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F	TEL：(06)6305-5871
東 京 営 業 部	〒366-0032	埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL：(048)551-2122
九州北部営業所	〒841-0025	佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL：(050)3508-7912
宮 崎 事 務 所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL：(0985)25-7051