

サンケイ化学 農薬登録情報

協友 アミスターエイト

アゾキシストロピン水和剤

登録番号：農林水産省登録第 21785 号（登録会社：協友アグリ株式会社）

有効成分：アゾキシストロピン・・・ 8.0% 殺菌剤分類：11

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「協友アミスターエイト」が令和 6 年 2 月 14 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「稲」の使用方法「散布」、希釈倍数「300 倍」、使用液量「25ℓ/10a」に適用病害虫名「稲こうじ病」「穂枯れ（ごま葉枯病菌）」「穂枯れ（すじ葉枯病菌）」「変色米（カーブラリア菌）」「変色米（エピコッカム菌）」「変色米（アルタナリア菌）」を追加する。
- ・作物名「稲」の使用方法「空中散布」に適用病害虫名「稲こうじ病」「穂枯れ（ごま葉枯病菌）」「穂枯れ（すじ葉枯病菌）」「変色米（カーブラリア菌）」「変色米（エピコッカム菌）」「変色米（アルタナリア菌）」を追加する。
- ・作物名「稲」の使用方法「無人ヘリコプターによる散布」を「無人航空機による散布」に変更し、適用病害虫名「稲こうじ病」「穂枯れ（ごま葉枯病菌）」「穂枯れ（すじ葉枯病菌）」「変色米（カーブラリア菌）」「変色米（エピコッカム菌）」「変色米（アルタナリア菌）」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法】

次ページに記す。

【注意事項の変更について】

- ・当該適用拡大に伴う注意事項の変更等はありません。
- ・なお、ご使用の際は商品に貼付されているラベルを参照してください。

【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌)	1000～ 1500倍	100～200ℓ /10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱散布は 1回以内、本田 では3回以内)
	稲こうじ病 穂枯れ (すじ葉枯病菌) 変色米 (カーブラリア菌) 変色米 (エピコッカム菌) 変色米 (アルタナリア菌)	1000倍					
	いもち病	300倍	25ℓ/10a			空中散布	
	紋枯病	原液	120～150mℓ /10a				
	稲こうじ病	8倍	800mℓ/10a				
	穂枯れ (ごま葉枯病菌)	30倍	3ℓ/10a				
	穂枯れ (すじ葉枯病菌)	8倍	800mℓ/10a				
	変色米 (カーブラリア菌)						
	変色米 (エピコッカム菌)						
	変色米 (アルタナリア菌)					無人航空機 による散布	



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL : (099)268-7588