

# サンケイ化学 農薬登録情報

## Zボルドー

銅水和剤

登録番号：農林水産省登録第 24041 号（登録会社：日本農薬株式会社）

有効成分：塩基性硫酸銅・・・58.0%（銅として 32.0%） 殺菌剤分類：M1

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「Zボルドー」は令和 6 年 3 月 13 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「たまねぎ」を追加する。
- ・作物名「ばれいしょ」に適用病害虫名「軟腐病」、希釈倍数「16 倍」、使用液量「1.6～3.2ℓ/10a」、使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「やまのいも」の適用病害虫名「葉渋病」「炭疽病」に希釈倍数「16 倍」、使用液量「3.2ℓ/10a」、使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「にんにく」の適用病害虫名「さび病」、「春腐病」、「白斑葉枯病」に希釈倍数「16 倍」使用液量「3.2ℓ/10a」、使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「アスパラガス」の適用病害虫名「斑点病」、「茎枯病」に希釈倍数「16 倍」、使用液量「3.2ℓ/10a」、使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」の適用病害虫名「黒腐病」に希釈倍数「500～1000 倍」、使用液量「100～300ℓ/10a」、使用方法「散布」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」の適用病害虫名「黒腐病」、使用方法「無人航空機による散布」の使用液量を「1.6～3.2ℓ/10a」に変更する。
- ・作物名「なす」、「きゅうり」、使用方法「常温煙霧」の使用量「588g/10a」を「294～588g/10a」に変更する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

- ・次ページに記す

#### 【注意事項の変更等について】

- ・今回の適用拡大に伴う使用上の注意事項等における変更等はありません。
- ・なお、ご使用の際には商品に貼付しているラベルをご一読ください。



サンケイ化学株式会社

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 又は 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	銅 を含む農薬の 総使用回数
ばれいしょ	疫病	400倍	100～300ℓ /10a	—	—	散布	—
	軟腐病	16倍	1.6～3.2ℓ /10a			無人航空機 による散布	
やまのいも	葉渋病	500倍	100～300ℓ /10a			散布	
	炭疽病	16倍	3.2ℓ/10a			無人航空機 による散布	
たまねぎ	軟腐病	16倍	1.6～3.2ℓ /10a			無人航空機 による散布	
にんにく	さび病	500倍	100～300ℓ /10a			散布	
	春腐病 白斑葉枯病	16倍	3.2ℓ/10a			無人航空機 による散布	
ブロッコリー	花蕾腐敗病	500倍	100～300ℓ /10a			散布	
	黒腐病	500～ 1000倍 16倍				1.6～3.2ℓ /10a	
アスパラガス	斑点病	500倍	100～300ℓ /10a			散布	
	茎枯病	16倍	3.2ℓ/10a	無人航空機 による散布			
	茎枯病	8倍	8ℓ/10a				

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	銅 を含む農薬の 総使用回数
なす	温室、ガラス室、 ビニールハウス等 密閉できる場所	すすかび病	294～588g/10a	10ℓ/10a	—	—	常温煙霧	—
きゅうり		べと病						