

サンケイ化学 農薬登録情報

ベンレート水和剤

ベノミル水和剤

登録番号：農林水産省登録第 20889 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ベノミル・・・・・・・・・・・・・・・・・・50.0% 殺菌剤分類：1

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ベンレート水和剤」は令和 6 年 1 0 月 2 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「トマト」の使用方法「灌注」を「土壌灌注」に変更し、それに伴い、ベノミルを含む農薬の総使用回数を「6 回以内（種子への処理は 1 回以内、土壌灌注は 2 回以内、散布及び常温煙霧は合計 5 回以内）」に変更する。
- ・作物名「ミニトマト」の使用方法「灌注」を「土壌灌注」に変更し、それに伴い、ベノミルを含む農薬の総使用回数を「6 回以内（種子への処理は 1 回以内、土壌灌注は 2 回以内、散布は 3 回以内）」に変更する。
- ・作物名「きゅうり」の使用方法「灌注」を「土壌灌注」に変更する。
- ・作物名「かんきつ（みかんを除く）」および「みかん」の適用病害虫名「貯蔵病害（青かび病）」、「貯蔵病害（黒斑病）」、「貯蔵病害（炭疽病）」および「貯蔵病害（緑かび病）」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更】

<追加>

- ・本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ること。
 - ① 散布は各散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
 - ② 散布にあっては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
 - ③ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
 - ④ 散布薬液の飛散によって自動車やカートを塗装等に影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
 - ⑤ 散布終了後は次の事項を守ること。
 - 1) 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄すること。
 - 2) 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
- ・無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 または 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペノミルを 含む農薬の 総使用回数
トマト	萎凋病	1000倍	150～ 300ml/株	定植前～ 定植 1か月後	2回以内	土壌灌注	6回以内 (種子への処理は 1回以内、 土壌灌注は 2回以内、 散布及び常温煙霧 は合計5回以内)
	菌核病	2000倍	100～ 300ℓ/10a	収穫前日 まで	5回以内	散布	
	灰色かび病 葉かび病	2000～ 3000倍					
ミニトマト	萎凋病	1000倍	150～ 300ml/株	定植前～ 定植 1か月後	2回以内	土壌灌注	6回以内 (種子への処理は 1回以内、 土壌灌注は 2回以内、 散布は3回以内)
	菌核病	2000倍	100～ 300ℓ/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	
	灰色かび病 葉かび病	2000～ 3000倍					
きゅうり	つる割病	1000倍	150～ 300ml/株	定植前～ 定植 1か月後	3回以内	土壌灌注	4回以内 (種子への処理は 1回以内、 は種後は3回以内)
	菌核病 黒星病 炭疽病 つる枯病 灰色かび病	2000～ 3000倍	100～ 300ℓ/10a			散布	
かんきつ (みかんを除く)	貯蔵病害(白かび病)	4000倍	200～ 700ℓ/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(黒斑病) 貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(緑かび病)	4000～ 6000倍					
	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(黒斑病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(緑かび病)	30倍	5ℓ/10a		無人航空機 による散布		
		60倍	10ℓ/10a				
みかん	そうか病 灰色かび病	2000～ 3000倍	200～ 700ℓ/10a	4回以内	散布	4回以内	
	貯蔵病害(白かび病)	4000倍					
	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(黒斑病) 貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(緑かび病)	4000～ 6000倍					
	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(黒斑病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(緑かび病)	30倍	5ℓ/10a		無人航空機 による散布		
		60倍	10ℓ/10a				

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ペノミルを 含む農薬の 総使用回数
トマト	温室、ガラス室、 ビニールハウス等の 密閉できる場所	灰色かび病	150g/10a	5ℓ/10a	収穫前日 まで	5回以内	常温 煙霧	6回以内 (種子への処理は 1回以内、 土壌灌注は 2回以内、 散布及び 常温煙霧は 合計5回以内)