

サンケイ化学 農薬登録情報

パダン SG 水溶剤

カルタップ水溶剤

登録番号：農林水産省登録第 18950 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：カルタップ塩酸塩・・・75.0%

殺虫剤分類：14

毒性：劇物

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「パダン SG 水溶剤」は令和 7 年 2 月 27 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「かぶ」を追加する。
 - ・作物名「おうとう」を追加する。
 - ・作物名「しそ」の使用時期「収穫 7 日前まで」を「収穫 3 日前まで」に変更する。
 - ・作物名「なばな」を「なばな類」に変更する。
 - ・作物名「かき」の適用病害虫名「カキノキマダラメイガ」を「フタモンマダラメイガ」に変更する。
 - ・作物名「もも」を追加する。
 - ・作物名「ネクタリン」を追加する。
 - ・作物名「すもも」を追加する。
 - ・作物名「大粒種ぶどう」を「ぶどう」に変更し、使用時期「収穫 21 日前まで」を「収穫 14 日前まで」に、**本剤の使用回数およびカルタップを含む農薬の総使用回数「5 回以内」を「2 回以内」に変更する。**
- ※朱書の内容については、負の適用拡大となりますので、使用にあたっては十分注意してください。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更等】

- ・本剤を側条施用する場合は次の注意を守ること。
 - ③アルカリ性ペースト肥料との混和は有効成分が分解するおそれがあるので、混和可能が確認されているペースト肥料以外との混和はさけること。
- ・かき、ぶどうは樹勢の弱い場合には薬害を生じるおそれがあるので使用しないこと。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目 9 番地

TEL：(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目 6-19 山本ビル

TEL：(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カルタップを含む農薬の総使用回数
もも ネクタリン すもも	アブラムシ類	1500倍	200～700 ℓ / 10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
おうとう	アメリカシロヒトリ			収穫前日 まで	1回		1回
ぶどう	スカシバ類 チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ			収穫14日前 まで	2回以内		2回以内
かき	イラガ カキホソガ チャノキイロアザミウマ フタモンマダラメイガ			収穫45日前 まで	4回以内		4回以内
	カキノヘタムシガ	1500～ 3000倍					
かぶ	キスジノミハムシ	1500倍	100～300 ℓ / 10a	収穫3日前 まで	3回以内		7回以内 (は種時の 土壌混和は1回以内、 散布は3回以内、 株元散布は3回以内)
なばな類	アブラムシ類 コナガ			収穫7日前 まで		3回以内	
しそ	アザミウマ類	3000倍		収穫3日前 まで	2回以内	2回以内	