

サンケイ化学 農薬登録情報

トクチオン乳剤

プロチオホス乳剤

登録番号：農林水産省登録第 13426 号（登録会社：アリスタ ライフサイエンス株式会社）

有効成分：プロチオホス・・・45.0%

殺虫剤分類：1B

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「トクチオン乳剤」は令和 7 年 3 月 12 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「にら」の適用病害虫名「アザミウマ類」を削除する。
- ・作物名「にら」の適用病害虫名「ネダニ類」の使用時期を「収穫 21 日前まで」、本剤の使用回数を「1 回」、プロチオホスを含む農薬の総使用回数を「2 回以内（土壌混和は 1 回以内、株元灌注は 1 回以内）」に変更する。
- ・作物名「鱗茎類（葉物、ただし、ねぎ、にら、にら（花茎）を除く）」及び「にら（花茎）」を削除する。
※朱書の内容については、負の適用拡大となりますので、使用にあたっては十分注意してください。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

（変更前）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キノキサリン系を含む農薬の総使用回数
にら にら(花茎)	アザミウマ類	1000倍	100~300 ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内 (土壌混和は1回以内)
	ネダニ類	2000倍	3 ℓ /㎡			株元灌注	
鱗茎類(葉物、 ただし、 ねぎ、にら、 にら(花茎)を 除く)	アザミウマ類	1000倍	100~300 ℓ /10a			散布	3回以内
	ネダニ類	2000倍	3 ℓ /㎡			株元灌注	

（変更後）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キノキサリン系を含む農薬の総使用回数
にら	ネダニ類	2000倍	3 ℓ /㎡	収穫21日前 まで	1回	株元灌注	2回以内 (土壌混和は1回以内、 株元灌注は1回以内)

※作物名「鱗茎類（葉物、ただし、ねぎ、にら、にら（花茎）を除く）」及び「にら（花茎）」は削除

【使用上の注意事項の追加】

- にらに使用する場合は、前作のにらを地際から刈り取りした後、できるだけ速やかに株元灌注し、希釈液が直接茎葉にかからないよう注意すること。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目 9 番地

TEL : (099)268-7588