

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ディアナSC

スピネトラム水和剤

登録番号：農林水産省登録第 22910 号（登録会社：住友化学(株)）

有効成分：スピネトラム・・・11.7%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「ディアナSC」が平成27年6月24日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「だいこん」に適用病害虫名「ウワバ類」「カブラハバチ」および「ハモグリバエ類」を追加する。
- ・作物名「はくさい」に適用病害虫名「アザミウマ類」「ウワバ類」および「オオタバコガ」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」の適用病害虫名「アザミウマ類」に使用方法「灌注」を追加し、スピネトラムを含む農薬の総使用回数を「2回以内」から「3回以内（定植時までの処理は1回以内、散布は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「ブロッコリー」に適用病害虫名「アザミウマ類」「ウワバ類」および「オオタバコガ」を追加する。
- ・作物名「たまねぎ」に適用病害虫名「ハスモンヨトウ」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」に適用病害虫名「ネギコガ」を追加する。
- ・作物名「アスパラガス」に適用病害虫名「オオタバコガ」および「コナジラミ類」を追加する。
- ・作物名「トマト」および「ミニトマト」の適用病害虫名「アザミウマ類」に希釈倍数「5000倍」を追加し、「2500～5000倍」に変更する。
- ・作物名「ピーマン」に適用病害虫名「オオタバコガ」および「コナジラミ類」を追加する。
- ・作物名「きゅうり」に適用病害虫名「コナジラミ類」を追加する。
- ・作物名「メロン」に適用病害虫名「コナジラミ類」および「ハモグリバエ類」を追加し、「タバココナジラミ」を削除する。
- ・作物名「なばな類」および「らっきょう」を追加する。
- ・作物名「りんどう」を追加し、作物名「花き類・観葉植物」を「花き類・観葉植物（りんどうを除く）」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大のみ記載）】

（表1）

作物名	適用病害虫名	使用濃度	10aあたり 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	スチベラムを含む 農薬の総使用回数
だいこん	コナガ	2500～5000倍	100～300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	アオムシ						
	ハイマダラノメイガ						
	ヨトウムシ						
	ウワバ類						
	カブラハバチ						
	ハモグリバエ類						
はくさい	アザミウマ類	2500～5000倍	100～300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	コナガ						
	アオムシ						
	ハイマダラノメイガ						
	ヨトウムシ						
	ハスモンヨトウ						
	ウワバ類						
オオタバコガ							
キャベツ	アザミウマ類	2500～5000倍	100～300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内（定植時までの 処理は1回以内、 散布は2回以内）
	コナガ						
	アオムシ						
	ハイマダラノメイガ						
	ヨトウムシ						
	ハスモンヨトウ						
	ウワバ類						
	オオタバコガ						
アザミウマ類	50～200倍	セル成型育苗 トレイ1箱また はペーパーポット 1冊（30× 60cm・使用 土壌約3～6 L）当り0.5L	育苗期後半	1回	灌注		
ブロッコリー	コナガ	2500～5000倍	100～300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	アオムシ						
	ハイマダラノメイガ						
	ヨトウムシ						
	ハスモンヨトウ						
	アザミウマ類						
	ウワバ類						
オオタバコガ							
たまねぎ	ハスモンヨトウ	2500～5000倍	100～300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	アザミウマ類						
ねぎ	アザミウマ類	2500～5000倍	100～300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	シロイチモジヨトウ						
	ネギハモグリバエ						
アスパラガス	ネギコガ	2500倍	100～500L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	コナジラミ類						
	アザミウマ類						
	オオタバコガ						

(表2)

作物名	適用病害虫名	使用濃度	10aあたり 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	スチロラムを含む 農薬の総使用回数
トマト ミニトマト	コナジラミ類	2500倍	100～300L /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	アザミウマ類	2500～5000倍					
	ハスモンヨトウ オオタバコガ						
ピーマン	コナジラミ類	2500倍					
	アザミウマ類	2500～5000倍					
	オオタバコガ						
きゅうり	コナジラミ類	2500倍					
	アザミウマ類	2500～5000倍					
	ハモグリバエ類						
メロン	コナジラミ類	2500倍					
	アザミウマ類	2500～5000倍					
	ハモグリバエ類						
なばな類	コナガ	2500～5000倍					
らっきょう	アザミウマ類						
花き類・観葉植物 (りんどうを除く)	アザミウマ類	2500～5000倍		発生初期	2回以内	散布	2回以内
	オオタバコガ						
りんどう	ハモグリバエ類	2500倍					
	リンドウハマキ						

## 【注意事項の変更について】

商品に貼付されているラベルを参照のこと



# サンケイ化学株式会社

本 社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9番地	TEL:(099)268-7588
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎市神宮三丁目6-19番地	TEL:(0985)25-7051