

サンケイ化学 農薬登録情報

ベンレート水和剤

登録番号：農林水産省登録 第20889号(登録会社：住友化学(株))
有効成分：ベンレート水和剤50.0%

毒性：普通物(毒劇物に該当しない物を指している通称)
販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『ベンレート水和剤』が平成25年8月28日付けで下記のように適用拡大されました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- 作物名「稲」の適用病害虫「いもち病」、使用方法「種子吹き付け処理」を追加。
- 作物名「なし」の適用病害虫「心腐れ症」の希釈倍数「3000倍」を「2000～3000倍」に変更。
- 作物名「はくさい」の適用病害虫名「白斑病」、希釈倍数「2000倍」を「2000～3000倍」に変更。
- 作物名「なたね」の追加。
- 作物名「ねぎ」の適用病害虫「小菌核腐敗病」、使用液量「セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊(30X60cm、使用土壌約5L)当たり500ml」、使用方法「灌注」を追加。
- 作物名「だいず」の適用病害虫「黒根腐病」を追加。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物の

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンレートを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	7.5～15倍	乾燥種籾1kg当た希釈液30ml	は種前(浸種前)又は浸種前	1回	種子吹き付け処理	2回以内(種子への処理は1回以内、床土への混和は1回以内)
なし	心腐れ症	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	6回以内(塗布は2回以内、散布は4回以内)
ねぎ	小菌核腐敗病	500倍	セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊(30X60cm・使用土壌約5L)当たり500ml	定植前	1回	灌注	3回以内(種子粉衣は1回以内、苗根部浸漬及び灌注は1回以内、散布は1回以内)
だいず	黒根腐病	乾燥種子重量の0.5%	-	は種前	1回	種子粉衣	5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内)
らっかせい	黒渋病	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	5回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内)
はくさい	白斑病	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)
なたね	菌核病	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内

<注意事項について>

変更なし

使用上の注意事項については製品に貼付のラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951
深谷 技術普及部 TEL:048-551-2122