

# タケの拡大抑制に 効果あり！



有効成分: 塩素酸ナトリウム 50.0% 1袋: 5kg

# テソルート AZ粒剤

春(3~5月)処理、  
秋(9~11月)処理が効果的!

# 処理・伐採した土地の有効活用に ソーラーパネル設置!

## ■ 散布時期区分

※効果発現・枯死対象種:マダケ、モウソウチク、ゴサンチク

9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
<b>推奨</b> <b>効果:大</b>	秋期処理					<b>推奨</b> <b>効果:大</b>	春期処理				

# タケの拡大抑制に効果あり！

## テソレート® AZ粒剤

有効成分: 塩素酸ナトリウム50%

### 特長

- 非選択性の除草剤で幅広い雑草に効果があり、特にタケ・ササ・ススキ・ヨモギなどに有効です。
- 駐車場、宅地などでも使用でき、タケ、ササ等の侵入箇所にも有効です。
- 根まで枯らし、翌年の再生を抑えます。

■ 使用量： タケ類 10アール当り 45～60kg ササ類 10アール当り 25kg

### ■ 効果的な散布目安量

目通り (タケの直径)	散布量 (1アール当り)
8cm以下	4.5～5kg
8～12cm	5～6kg
12cm以上	6kg

### ■ 効果的な散布方法



### ■ 適用作物・雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	塩素酸塩を含む農薬の 総使用回数
樹木等	公園、堤とう 駐車場、道路 運動場、宅地 のり面等	一年生及び 多年生雑草	雑草生育 初期～中期	15～25kg/10a	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 雑草茎葉散布	3回以内
		竹類	生育期	45～60kg/10a	1回	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 全面土壤散布	(全面土壤散布は1回以内) 但し当該処理をする場合には 雑草茎葉散布は1回以内)

■ 毒性：急性経口 ラット>5,000mg/kg(製剤)

■ 包装単位：1袋:5kg

### ⚠ 使用上の注意事項

- 本剤は従来品に比べて難燃性に製剤してありますが、散布前後には散布機をよく清掃して油や汚れを拭き取ってください。
- 散布時に本剤が、身体や作業衣に付着の少ないよう風向等に注意し、散布したところを歩かないでください。
- 本剤のしみこんだ作業衣は、火気に対して燃えにくくなっていますが、作業後水洗いしてください。
- 水源池、飲料水等に飛散・流入しないように十分注意してください。
- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しないでください。  
また、樹木等有用植物の根が分布しているところでは使用を避けてください。
- 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。  
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを使用してください。  
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、使用中及び使用後（少なくとも使用当日）に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 本剤は家畜が好んで食べて中毒を起こすことがあるので保管に注意し、また使用直後の使用区域への家畜の放飼は行わないでください。
- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●容器、空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

