

サンケイ

イネシンガレセンチュウの防除に

スミチオン® 乳剤

イネシンガレセンチュウ防除のポイントは種子消毒

イネシンガレセンチュウによるイネの被害は「葉先の変色」と米の品質に関係する「黒点米(目黒米)」とがあります。

最近シンガレセンチュウによる被害が増加しています。種子消毒の重要性が見直されつつあります。生育期間中の本田防除では不十分でやはり「予防的」に行う種子消毒が是非とも必要です。



イネシンガレセンチュウ



葉先の被害



黒点米(目黒米)

イネシンガレセンチュウの被害で玄米に割れ目ができ、黒褐色になる。

特長

- 殺センチュウ活性に優れ、安定した被害防止効果があります。
- 薬害の心配がほとんどなく、安心して使用できます。
- ほとんどの種子消毒剤(殺菌剤)と混用できます。

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
稲	イネシンガレセンチュウ	1,000倍	は種前	1回	6~72時間浸漬	3回以内 (種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田は2回以内)

⚠ ラベルをよく読む ⚠ 記載以外には使用しない ⚠ 小児の手の届く所には置かない

※スミチオン® は住友化学株式会社の登録商標




サンケイ化学株式会社

サンケイ

スミチオン[®] 乳剤

種子消毒の手順（例）

塩水選


塩水選で良質な
種籾を選ぶ水でよく洗い
袋につめる。

スミチオン乳剤20ml

※200倍で使用する殺菌
剤を混用する場合は
水20ℓに対して液剤で
は100ml、水和剤では
100g が必要です。

消毒液（1,000倍）

水20ℓ



消毒 24時間（浴比は通常、種子：希釈液=1：1～2）

浸種 ➡ 催芽 ➡ 播種

1,000 倍液を
作る場合水 10ℓ に対して
水 20ℓ に対してスミチオン乳剤 10ml
スミチオン乳剤 20ml

●スミチオン乳剤の容器（100ml・500ml）のキャップ（蓋）一杯で8mlです。

塩水選の比重	作 型	種 類	比 重	水10ℓ当り	
				食塩の場合	硫酸の場合
普通期水稻		うるち	1.13	2.1kg	3.0kg
		もち	1.08	1.3kg	1.7kg
早期水稻		うるち	1.10	1.7kg	2.5kg
		もち	1.06	1.0kg	1.2kg

注意：“塩水選”の比重については各県・各地区の基準に従ってください。



JAグループ

農 協

全 農

経済連



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 ☎099 (268) 7588 (代)

九州北部営業所 〒841-0025 鳥栖市曾根崎町1154-3 ☎0942 (81) 3808 (代)

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東3-6-19 (山本ビル) ☎0985 (25) 7051