

サンケイ

コデツ[®]ベイト

難防除害虫 ホウレンソウケナガコナダニに効く

® = BASF社の登録商標

コナダニ防除の常識は ベイトで変える。

特長

- 難防除害虫である
ホウレンソウケナガコナダニに卓効
- 害虫を誘引し食毒により防除
- 混和する必要なく、処理が簡便
- 優れた残効性



ベイト粒



圃場に撒くだけで害虫を誘引



ホウレンソウ
ケナガコナダニ

いままで難しかったケナガコナダニ防除は、 コテツベイトが解決します。


■ 使い方



全面散布処理なので、土壌混和する必要はありません。

■ 防除効果（日植防委託試験成績書）

ホウレンソウケナガコナダニに対する効果



秋田県農業試験場
(2019年：秋田県秋田市 農試圃場内ハウス)
供試作物：ほうれんそう（品種：ドンキー）
8㎡/1区 3反復
は 種：2019年8月23日
対象害虫発生状況：少発生（放虫）
処 理 日：コテツベイト（8月23日：は種時1回全面土壌散布）
A剤（8月23日：は種前1回全面土壌混和）
調 査 日：散布前（8月23日）、散布7日後（8月30日）、
散布16日後（9月8日）、散布23日後（9月15日）、
散布33日後（9月25日：収穫期）
土壌中密度：酵母トラップ（春日方式）4地点/1区
各区表層（5cm深）の土壌各100ml中のコナダニ
数合計/3反復の平均値

コテツベイトは優れた残効性が確認されています

■ 適用病害虫名と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む 農薬の総使用回数
ほうれんそう	ホウレンソウ ケナガコナダニ	3～6kg/10a	は種時～2葉期まで 但し、収穫14日前まで	1回	全面土壌散布	1回

⚠ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 所定量の薬剤を圃場全体に均一に散布してください。
- 全面土壌散布の場合は施設内の使用に限ります。
施設外に飛散させないでください。(2021年12月に追加)
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及び
その周辺にかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤
らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫
防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠ 貯蔵上の注意事項

- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管
してください。

- ★ 使用前にはラベルをよく読んでください。★ ラベルの記載以外には使用しないでください。
- ★ 小児の手の届くところには置かないでください。
- ★ 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- ★ 防除日誌を記帳しましょう。

※この資料は2022年1月現在の知見に基づき作成したものです。

