

しつこいアワも速効クリア

消泡スプレー

あわナックス[®]

あわナックス[®]の消泡効果(300ℓタンク)

園芸ボルドー(×400)+ブレイクスルー(×5000)調製時



薬液調製直後



あわナックス噴霧時

あわナックス[®]の特徴

- エアゾルタイプではなく、トリガースプレータイプ。
- 早く、数秒で消泡効果を発揮。
- 希釈液にあらかじめ混ぜても消泡効果を発揮。
- 次薬液調製時に消泡効果が持続する。
- 使用薬剤薬液への展着性、乳化性等に影響がない。
- 消防法の制約がない。



サンケイ化学株式会社

消泡スプレー[®] あわナックス

規 格：300 ml

有効期限：3年

使用方法

使用薬剤名	使用目的	使用方法
乳剤 水和剤 液剤 展着剤	農薬散布液調製時および散布器具等洗浄時の 消泡または泡立ち防止。	噴霧

- 泡に向かって吹き付けるように複数回噴霧して下さい。噴霧後、薬液を攪拌すると、より確実に消泡できます。
- あらかじめ攪拌前の薬液に噴霧し希釈しておくこと、泡の発生を防止することができます。
- 同じ散布器具で、複数回の薬液調製を予定している場合、最初の薬液調製時、本剤を使用すると以降の薬液調製時の泡の発生を抑えることができます。

* 薬剤調製回数、使用薬剤により効果が不十分な場合もありますので、注意してください。

目安表

泡を消す場合

100 Lに対して1~2回
噴霧してください。



泡を発生しにくくする場合

〈噴霧する場合〉

100 Lに対して3~8回
噴霧してください。



〈投入する場合〉

①ノズルをとって、原液を
計量カップにいれてください。


②計量カップからタンクへ
投入してください。




効果持続性

園芸ボルドー + ブレイクスルーへの効果持続性

250 ml シリンダー試験



300 L タンク試験



使用上の注意事項

- 使用直前に必ずよく振ってからご使用ください。
- 起泡性を必要とするフォームスプレー（泡散布）用の薬液にはご使用できません。
- ジベレリンなどの植物成長調整剤の薬液にはご使用できません。
- ご使用の際はマスク、手袋などをして噴霧した霧を吸入しないように注意し、作業後は頭、手足など皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 直射日光をさけ、子供の手の届かない場所に、食品と区別して保管してください。
- 5℃以下の低温な場所へ長期保管した場合、噴霧が不十分になる場合があります。その場合は室温にて保温後、よく振ってご使用いただければ、噴霧が良好になります。
- 5℃以下の場所へ保管すると、凍結する恐れがありますので注意してください。
* 凍結（固化）した場合、室温にして解凍後、よく振ってご使用いただければ、消泡効果へ影響はありません。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所に置かないでください。

お申し込みは

【製造・販売】



サンケイ化学株式会社

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11

☎(03) 3845-7951

東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1-13-1

☎(048) 551-2122

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目14-6

☎(06) 6305-5871

本社 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄2-9

☎(099) 268-7588