

除草剤

サンケイ
ブッシュ

- DCMU 水和剤 -

非ホルモン型の除草剤で茎葉あるいは根から吸収!

光合成を阻害することにより防除効果を発揮!

イネ科、広葉雑草を問わずほとんどの一年生雑草に有効!

製品情報はこちら



サンケイ化学株式会社

除草剤

サンケイ ダイコン

農林水産省登録 第24636号

有効成分: DCMU(化管法・1種)…80.0%

性状: 類白色水和性粉末

毒性: 普通物(毒劇物に該当しないものを指す)

有効年限: 5年

包装: 100g×50、300g×20

除草剤分類 5

適用雑草名および使用方法

2024年7月24日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量 (10a当たり)	散布液量 (10a当たり)	本剤の 使用回数	使用方法	DCMUを含む農薬の 総使用回数
だいじ あずき	一年生雑草	一年生雑草	は種直後～発芽前	70～100g	100L	1回	全面土壤散布	2回以内(出芽前は1回以内、生育期は1回以内)
ばれいしょ			植付後～萌芽前					1回
らっかせい			は種直後					2回以内(萌芽前は1回以内、生育期は1回以内)
さとうきび		多年生広葉雑草	植付後萌芽前 又は収穫後萌芽前	100～150g	70～100L		雑草茎葉散布	1回
飼料用 さとうきび			雑草生育期 ただし、収穫90日前まで		100L		全面土壤散布	2回以内(萌芽前は1回以内、生育期は1回以内)
食用亜麻			植付後萌芽前 又は収穫後萌芽前		70～100L		全面土壤散布	1回
小麦(秋撒)		多年生広葉雑草	雑草生育期 ただし、収穫90日前まで		60g		雑草茎葉散布	2回以内
りんご なし もも かき ぶどう うめ かんきつ			生育期(8葉展開期以降) (雑草発生抑制) ただし、収穫60日前まで		60g		全面土壤散布	2回以内
あま(单作)			は種直後	60～70g	100L		全面土壤散布	1回
うこん	一年生雑草	一年生雑草	雑草発生前	100～200g	100L	1回	ノン系展着剤を加えて 雑草茎葉散布	1回
桑			雑草生育期	200～400g			全面土壤散布	2回以内
樹木等			子葉展開期	60～80g			全面土壤散布	2回以内(萌芽前は1回以内、生育期は1回以内)
公園、庭園、堤 とう、駐車場、 道路、運動場、 宅地、のり面等		一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草発生始期)	100～200g		2回以内	全面土壤散布	1回
			生育期 (畦間処理: 雜草発生始期) ただし、収穫75日前まで				全面土壤散布	3回以内
			雑草発生前	60～200g			植栽地を除く樹木等の 周辺地に全面土壤散布	
			雑草生育期	200～400g			植栽地を除く樹木等の 周辺地にノン系展着剤を 加えて雑草茎葉散布	

⚠ 使用上の注意事項

- 覆土はできるだけ土を細かく碎いて、必ず3～4cmの厚さに均一に行ってください。
- 砂質で水はけのよい畑や雨の多い時期にはDCMUが土中深く浸透して作物の根をおかし、薬害を起こすおそれがあるから注意してください。
- 薬液はときどきかけながら、むらのないように散布してください。
- 近くに根の浅い作物がある場合は、散布液が流れで行かないように注意してください。
- 使用後、容器や散布器具は必ず十分水で洗ってください。
- さとうきび、飼料用さとうきびの新苗後、分けがつ始まる頃に薬剤がかかると薬害が発生することがあるので、さとうきび、飼料用さとうきびにかかるないように注意して散布してください。
- 食用亜麻で試用する際には、生育の進んだ雑草には効果が劣ることがあるので、中耕などの機械除草との併用により効果の安定をはかってください。
- うこんに使用する場合、以下のことに注意してください。
- 植付時には土壌を細かく碎いて均一厚めに十分な覆土を行うとともに、植付深度を確保し、浅植えとないように注意してください。

- 畠間処理に使用する場合、専用ノズルを使用して作物にかからないようにしてください。
- 公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意してください。
 - 激しい降雨の予想される場合は使用をさせてください。
 - 散布液液の飛散、あるいは本剤漏出によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分に注意して散布してください。
 - 水源池、養魚池等に本剤が飛散、流れないよう十分に注意してください。
 - 散布液液の飛散によって自動車やカラートンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 蚕に対して影響があるので、桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の散布適期は雑草発生前から生育期(草丈15cm以下)であり、生育の進んだ雑草には効果が劣るので、時期を失しないように散布してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠ 安全使用上の注意事項

1. 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
2. 敷布の際は農業用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
3. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
4. かぶれやすい体质の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさせてください。

5. 夏期高温時の使用はさせてください。
6. 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
7. 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

⚠ 生活環境動植物に関する注意

1. 水産動植物(藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
2. 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所に置かないでください。

NIK DR 2025055

取扱い



サンケイ化学株式会社

東京本社
東京営業部
大阪営業所

〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11
〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1
〒532-0011 大阪市淀川区西中島2丁目14-6

(03)3845-7951 (048)551-2122

(06)6305-5871