

除 草 剤

サンケイ

ダイロン

— DCMU水和剤 —

 **非ホルモン型**の除草剤で**茎葉あるいは根から吸収!**

 **光合成を阻害**することにより**防除効果**を発揮!

 イネ科、広葉雑草を問わず**ほとんどの一年生雑草に有効!**



サンケイ化学株式会社

製品情報はこちら





サンケイ

ダイロン

農林水産省登録 第24636号

有効成分：DCMU(化管法・1種)…80.0%

性 状：類白色水和性粉末

毒 性：普通毒(毒劇物に該当しないものを指している通称)

有効年限：4年

包 装：100g×50、300g×20

除草剤分類 5

適用雑草名および使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10a当たり 使用量	10a当たり 希釈水量	本剤の 使用回数	使用方法	DCMUを含む 農薬の総使用回数	
陸稲	―	一年生雑草	は種直後	60～100g	100L	1回	全面土壌散布	1回	
麦類(冬作)		ヤエムグラおよび 一年生雑草	ヤエムグラ 発芽揃期	60～70g					ノニオン系展着剤を 加えて雑草茎葉散布
らっきょう		一年生雑草	植付覆土後	60～100g			全面土壌散布		
りんご、なし、 もも、かき、 かんきつ、ぶどう、 おうとう、うめ			雑草発生前	200～400g					
だいず あずき			は種直後 ～発芽前	70～100g		全面土壌散布			
らっかせい			は種直後	60～100g			1回		
ばれいしょ			植付後～萌芽前	70～100g					
食用亜麻			生育期(8葉展開期以降)(雑草発生 揃期)ただし、収穫60日前まで	60g		2回以内	雑草茎葉散布	2回以内	
さとうきび		植付後萌芽前 又は収穫後萌芽前	100～150g	70～100L	全面土壌散布	2回以内 (萌芽前は1回以内、 生育期は1回以内)			
		多年生広葉雑草		雑草生育期 ただし、収穫90日前まで			100L	雑草茎葉散布	
飼料用さとうきび		一年生雑草	100～150g	70～100L	1回	全面土壌散布	1回		
		多年生広葉雑草				雑草生育期 ただし、収穫90日前まで		雑草茎葉散布	
あま(単作)		一年生雑草	子葉展開期	60～80g		100L	全面土壌散布	2回以内	
うこん			植付後萌芽前 (雑草発生始期)	100～200g			雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	2回以内 (萌芽前は1回以内、 生育期は1回以内)	
			生育期(畦間処理:雑草発生始期) ただし、収穫75日前まで						
桑			一年生雑草	雑草発生前	100～200g		全面土壌散布	1回	
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面等			雑草発生前	60～200g		3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 全面土壌散布	3回以内
		雑草生育期	200～400g	植栽地を除く 樹木等の周辺地に ノニオン系展着剤 を加えて 雑草茎葉散布					

⚠ 使用上の注意事項

- 覆土はできるだけ土を細かく砕いて、必ず3～4cmの厚さに均一に行ってください。
- 砂質で水はけのよい畑や雨の多い時期にはDCMUが土中深く浸透して作物の根をおかし、葉害を起すおそれがあるから注意してください。
- 薬液はときどきかきまぜながら、むらのないように散布してください。
- 近くに根の浅い作物がある場合は、散布液が流れて行かないように注意してください。
- 使用后、容器や散布器具は必ず十分水で洗ってください。
- さとうきび、飼料用さとうきびの新植後、分けつが始まる頃に薬剤がかかると葉害が発生することがあるので、さとうきび、飼料用さとうきびにかからないように注意して散布してください。
- 食用亜麻で試用する際には、生育の進んだ雑草には効果が劣ることがあるので、中耕などの機械除草との併用により効果の安定をはかってください。
- うこんに使用する場合、以下のことに注意してください。
 - 植付時には土壌を細かく砕いて均一厚めに十分な覆土を行うとともに、植付深度を確保し、浅植えとないように注意してください。
 - 畝間処理に使用する場合、専用ノズルを使用して作物にかからないようにしてください。
- 公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意してください。
 - 激しい降雨の予想される場合は、使用をさけてください。
 - 散布液の飛散、あるいは本剤流出によって有用植物に葉害が生じることのないよう十分に注意して散布してください。
 - 水源池、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
 - 散布液の飛散によって自動車やカラートンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 畜に対して影響があるので、桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の散布適期は雑草発生前から生育期(草丈15cm以下)であり、生育の進んだ雑草には効果が劣るので、時期を失しないように散布してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠ 安全使用上の注意事項



- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。

⚠ 生活環境動植物に関する注意

- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください。
- 使用残りの薬液がしゅうじないよう調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所に置かないでください。

NIK DR 2023055

取扱い



サンケイ化学株式会社

東京本社
東京営業部
大阪営業所

〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11
〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1
〒532-0011 大阪市淀川区西中島2丁目14-6

☎(03)3845-7951
☎(048)551-2122
☎(06)6305-5871