

農林水産省登録
第11297号

殺菌剤

ドーマイシン

水和剤

ストレプトマイシン・有機銅水和剤

軟腐病・腐敗病等の防除に

優れた予防効果！



サンケイ化学株式会社

® はサンケイ化学(株)の登録商標

殺菌剤

ドーマイシン水和剤

ストレプトマイシン・有機銅水和剤

農林水産省登録 第11297号

有効成分: 8-ヒドロキシキノリン銅 40.0%
ストレプトマイシン硫酸塩 6.3%
(ストレプトマイシンとして5.0%)性状: 黄褐色水和性粉末45 μ m以下
毒性: 普通物
有効年限: 3年
包装: 500g袋×20

特長

保護殺菌作用の強い有機銅と細菌病に優れた効果を示す
ストレプトマイシンを有効成分とし、それぞれの特長を生かした
製剤で、安定した効果を示します。

適用病害虫名および使用方法

平成21年12月24日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ストレプトマイシン を含む農薬の 総使用回数	有機銅を 含む農薬の 総使用回数
こんにゃく	腐敗病 葉枯病	500	収穫30日前まで	6回以内	散布	6回以内 (種いもへの 処理は1回以内)	8回以内
はくさい	軟腐病	600～1000		3回以内		3回以内	5回以内
レタス	軟腐病 腐敗病	1000	収穫21日前まで	2回以内		2回以内	
キャベツ	黒腐病		収穫14日前まで				
シクラメン	軟腐病	500	—	4回以内		8回以内	5回以内

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- アルカリ性農薬と混用する場合は散布直前に混ぜてください。
- 散布の際は、葉裏にもよくかかるように散布してください。
- シクラメンの軟腐病に使用する場合、茎葉だけでなく、球根部に対しても十分かかるように散布してください。
- 本剤の使用により、葉害としてクロロシス(黄化現象)を生じることがあります。特に、高温多湿時及び幼苗期には葉害を生じやすいので留意の上、散布してください。
- はくさいに使用する場合、高温期及び幼苗期の散布をさけてください。
- レタス及びキャベツに使用する場合、高温期の連続散布はさけてください。
- 粉末は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。
- また散布液も眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。

●ラベル記載以外には使用しないでください。

●小児の手の届く所に置かないでください。

取扱い



サンケイ化学株式会社

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11 TEL(03)3845-7951
 深谷分室 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1 TEL(048)551-2122
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4丁目5-1 TEL(06)6305-5871