

# ガードベイト®A

## ペルメトリン粒剤

### 特徴

- ◎ネキリムシを誘引し、摂食させることで効果を発揮するベイト剤です。
- ◎成分は合成ピレスロイドなので、優れた殺虫・被害防止効果があります。
- ◎赤色の粒剤ですので、散布したところがよくわかります。



ネキリムシから  
大切な作物を守る!!



ガードベイトAの形状



サンケイ化学株式会社

®はサンケイ化学(株)の登録商標


## 適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペルメトリンを含む農薬の総使用回数
はくさい、ごぼう	ネキリムシ類	3kg/10a	は種時～生育初期	5回以内	株元散布	5回以内
だいこん				4回以内		4回以内
キャベツ			生育初期	5回以内		5回以内 (株元灌注は2回以内)
レタス、ブロッコリー				5回以内		5回以内
カリフラワー、かぼちゃ				5回以内		5回以内
いちご、たまねぎ				5回以内		5回以内
かんしょ、やまいも				5回以内		5回以内
ピーマン、さといも			生育初期 但し収穫14日前まで	2回以内		5回以内 (乳剤は3回以内、粒剤は2回以内)
たかな				2回以内		4回以内 (乳剤は2回以内、粒剤は2回以内)
非結球レタス				1回		4回以内 (株元散布は1回以内、散布及び噴霧は合計3回以内)
ミニトマト			収穫3日前まで	4回以内		4回以内 (散布は2回以内)
かぶ				3回以内		3回以内
にら にら(花茎)				5回以内		5回以内
にんじん			生育初期 但し収穫7日前まで	2回以内		2回以内
ほうれんそう しゅんぎく				3回以内		6回以内 (乳剤は3回以内、粒剤は3回以内)
ズッキーニ				4回以内		4回以内
とうもろこし ぱれいしょ			生育初期 但し収穫開始7日前まで	3回以内		3回以内
なす、トマト、ねぎ、わけぎ あさつき、そらまめ、だいず きゅうり、なばな類 豆類(未成熟)				4回以内		4回以内
オクラ				3回以内		3回以内
らっかせい			収穫7日前まで	3回以内		3回以内
とうがらし類				2回以内		2回以内
しそ				4回以内		4回以内 (乳剤は2回以内、粒剤は2回以内)
にんにく			生育初期 但し収穫90日前まで	2回以内		4回以内
しょうが				4回以内		4回以内
葉しょうが				3回以内		3回以内
アスパラガス、パセリ			定植時～発芽期 但し収穫120日前まで	3回以内		3回以内
はっか				2回以内		2回以内
エンダイズ				3回以内		3回以内
もりあざみ			生育初期 但し収穫30日前まで	2回以内		2回以内
エンサイ				4回以内		4回以内
飼料用とうもろこし (青刈り) ヤングコーン				3回以内		3回以内
びゃくし			収穫前日まで	2回以内		2回以内
いんちんこう				3回以内		3回以内
食用おおばこ(種子)				2回以内		2回以内
花き類・観葉植物			生育初期 但し収穫14日前まで	4回以内		4回以内
たばこ				4回以内		4回以内
				3回以内		3回以内
			収穫90日前まで	3回以内		3回以内
				3回以内		3回以内
				3回以内		3回以内
			収穫30日前まで	6回以内		6回以内
				1回		1回

## ⚠ 使用上の注意事項

- 作物体上から作物の地際の表面に散布してください。
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかられないようにしてください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新商品に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。  
なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 誤食などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。  
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布の際はマスク、手袋などをしてください。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 本剤による中毒の治療法としては動物実験でメタルカルバモール製剤の投与が有効であると報告されています。
- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が誤食するおそれがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないでください。
- 直射日光を避け、子供の手の届かないなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

## 〈上手な使い方〉



混和せずに、土壤表面の作物の株元に散布しましょう。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所に置かないでください。

NIK-GBA2022.09S

取扱い



サンケイ化学株式会社

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野7-6-11 ☎(03) 3845-7951  
東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1 ☎(048) 551-2122  
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島2丁目14-6 ☎(06) 6305-5871