



殺虫剤

サンケイ
トレボン[®] 乳剤

有効成分：エトフェンブロックス……………20.0%

トレボン乳剤は

たくさんの作物と害虫に使えます。

栽培する作物、発生する害虫に合わせてご使用ください。

公園の樹木、街路樹のケムシにも！



■ 適用病害虫名と使用方法

2024年4月24日現在の登録内容

作物名・適用場所	適用病害虫名	希釈倍数 (倍)	10aあたり使用液量	使用時期	使用回数※1	使用方法		
たばこ	タバコガ、ヨトウムシ	2000	25 ~ 180 ℓ	収穫10日前まで	2回以内	散布		
	アブラムシ類、タバコノミハムシ	1000 ~ 2000						
樹木類 (つつじ類、ポインセチア、ソテツを除く)	ケムシ類、シャクトリムシ類	4000	100 ~ 700 ℓ	幼虫発生期	6回以内			
	オビカレハ	2000		—				
つつじ類	ツツジゲンバイ	2000		100 ~ 700 ℓ			—	6回以内
	ケムシ類、シャクトリムシ類	4000					幼虫発生期	
	オビカレハ	2000					—	
ポインセチア	コナジラミ類	1000		100 ~ 700 ℓ			幼虫発生期	6回以内
	ケムシ類、シャクトリムシ類	4000						
	オビカレハ	2000						
ソテツ	クロマダラソテツシジミ	2000 ~ 4000		100 ~ 700 ℓ			幼虫発生期	6回以内
	ケムシ類、シャクトリムシ類	4000						
	オビカレハ	2000						
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ	1000		100 ~ 300 ℓ		—	4回以内(1年間に2回以内)	
	ヨトウムシ	2000						
りんどう	ヒラズハナアザミウマ	2000	100 ~ 300 ℓ		発生初期			
きく	アブラムシ類	2000			—			
カーネーション					—			
ゆり	アブラムシ類	2000			—			
トルコギキョウ					ハスモンヨトウ	1000		幼虫発生期
とうき	キアゲハ	1000			100 ~ 300 ℓ	幼虫発生期		12回以内(1年間に6回以内)
採種用とうき								
おうぎ	ウリハムシモドキ	1000			100 ~ 300 ℓ	収穫45日前まで		4回以内(1年間に2回以内)

※1 本剤の使用回数および、エトフェンブロックスを含む農薬の総使用回数を示す。



サンケイ化学株式会社

