

展着剤

ベタリン®-A

ベタリン®はサンケイ化学㈱の登録商標です。

作物への 付着性向上に！

薬液の付着しにくい作物にも
効果を発揮！

主剤の効果を十分に引き出し
効果を安定させます！！



おすすめの使用量



- 稲・麦・キャベツ・ねぎ等、
薬液が付着しにくい作物には **10ℓあたり2～4ml**
- 果樹、野菜等で
薬液が付着しやすい作物には **10ℓあたり1～2ml**



サンケイ化学株式会社

展着剤

ベタリン®-A

ベタリン®はサンケイ化学㈱の登録商標です。

登録番号：農林水産省登録 第13800号
性状：淡黄色粘稠液体
毒性：普通物
(毒物及び劇物に該当しないものを指している通称)
有効年限：5年
包装：500ml×20

有効成分：ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル 20.0%
(ポリ (オキシエチレン) =ノニルフェニルエーテル (PRTR・1種) 14.0%)
(ポリ (オキシエチレン) =オクチルフェニルエーテル (PRTR・1種) 6.0%)

特 長

薬液のつきにくい作物に対しても、薬液をしっかり付着させ、主剤の効果を安定させます。

適用および使用方法

適用農薬名	作物名	散布液10ℓ当り使用量 (希釈倍数)	使用方法
有機リン剤、 カーバメート剤等の殺虫剤、 抗生物質剤、硫黄剤、銅剤、 ボルドー液等の殺菌剤	稲、麦、キャベツ、ねぎ等で 展着しにくい作物	2～4ml (2,500～5,000倍)	添加
	果樹、野菜等で 薬液のつきやすい作物	1～2ml (5,000～10,000倍)	
パラコート液剤、 ジクワット液剤等の除草剤	水田作物、畑作物等	5～15ml (667～2,000倍)	

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤の所定量を直接散布液に加え、十分かきまぜてから散布してください。
- 使用前に瓶を軽く振って均一にしてから使用してください。
- 稲、麦、キャベツ、ねぎなど薬液のつきにくい作物又は雑草に散布する場合には多めに加用し、果樹、そ菜などで薬液のつきやすい作物又は雑草に散布する場合には少なめに加用してください。

安全使用上の注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 危険物第4類第2石油類に属するので火気に十分注意してください。
- 火気をさけ、直射日光の当たらない低温な場所に密栓して保管してください。



● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

取扱い



サンケイ化学株式会社

東京本社 東京都台東区上野7丁目6-11 ☎ 03-3845-7951
東京営業部 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1 ☎ 048-551-2122
大阪営業所 大阪市淀川区西中島2丁目14-6 ☎ 06-6305-5871

2301SA/BU2T