

ナメクジ類・カタツムリ類を誘引・摂食させて防除!

殺虫剤

ナメククリーン®3

メタアルデヒド粒剤



殺虫剤 農林水産省登録 第23655号

ナメクジ・カタツムリ一発撃退!

ナメククリーン®3

【メタアルデヒド粒剤】 2kg入

★ラベルをよく読む。★記載以外には使用しない。★小児の手の届く所には置かない。

成分：メタアルデヒド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3.0%
 殺菌剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97.0%

性状：吸湿性粒剤

適用病害虫の範囲および使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール当たり 使用量	使用時期	使用方法	使用回数
かんきつ			収穫30日前まで	3回	1回(10アールあたり) 2回(10アールあたり) 3回(10アールあたり)
キャベツ レタス	ナメクジ類	1~3kg	収穫14日前まで	株元散布	2回 (株元散布は 2回以上)
	カタツムリ類	3kg			
ほうさい			収穫3日前まで		
セルリー	ナメクジ類	1~3kg	収穫前日まで		
アスパラガス			収穫前日まで		
ふき			収穫7日前まで		
アスパラガス	カタツムリ類	1~3kg			6回 (株元散布は 2回以上)

●結果・被害等の注意
 ●雨や水が溜まるかたまりの場所では効果が減少する。乾燥した状態が効果を高める。収穫前3日以内は効果が減少する。
 ●かたまりの場所には必ず散布する。
 ●散布した後に雨が降ると効果が減少する。
 ●散布した後に雨が降ると効果が減少する。
 ●散布した後に雨が降ると効果が減少する。

●適用作物に属する作物にはその農産物に被害が生ずる場合は、収穫前までに十分に事前に散布の効果を十分に確認する。使用方法を厳守する。特に初めて使用する場合は、農産物の被害の有無を確認する必要がある。

●安全使用上の注意
 ●使用時に目や皮膚に付着し、服に付着しない。
 ●大気中の浮遊粉塵を吸入しない。
 ●食料や飼料に付着しない。

●保管・取扱い
 ●直射日光を避け、食品と区別して、密閉容器に保管する。
 ●空容器は必ず空にして、適切に処理する。

●製造工場 アークサークル
 ●スイス国アイブス CH-3930
 ●サンケイ化学株式会社

●販売先
 ●小笠原工場 東京都中央区日本橋1-9-1
 ●徳島工場 徳島県徳島市東町1-1
 ●深谷工場 埼玉県深谷市南町1-1
 ●1000011

最終有効年月 10年(2024年)
 最終有効年月 製造ロットは口頭にてお尋ねいただけます。

販売 **サンケイ化学株式会社**
 本社 鹿児島市南栄二丁目9番地 ☎099-268-7588(月~金)



非結球あぶらな科葉菜類、セルリー、アスパラガス、ふきに適用拡大!



ナメククリーン®はサンケイ化学㈱の登録商標



サンケイ化学株式会社



製品情報・SDSはこちら

殺虫剤

ナメクグリーン3[®]

農林水産省登録 第23655号
有効成分：メタルデヒド 3.0%

殺虫剤分類 一

性 状：暗青色粒状
人畜毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指すという通称）

規 格：500g×20、1kg×12、2kg×8

特長

- ナメクジ類・カタツムリ類を誘引し、摂食させて効果を発揮するベイト剤です。
- 有効成分のメタルデヒドは、ナメクジ類・カタツムリ類に対して速効的で高い効果を示します。
- 青色の粒剤ですので、散布したところがよくわかります。

適用病害虫名及び使用方法

2023年11月8日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	10a当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メタルデヒドを含む 農薬の総使用回数
かんきつ	ナメクジ類 カタツムリ類	1~3kg	収穫30日前まで	3回以内	株元散布	6回以内（散布及び 株元散布は合計3回以内）
非結球あぶらな科 葉菜類	ナメクジ類		収穫3日前まで	2回以内		6回以内 （株元散布は2回以内）
キャベツ レタス	ナメクジ類 カタツムリ類		収穫14日前まで			6回以内（散布及び株元散布 は合計3回以内（但し、株元 散布は2回以内））
はくさい	ナメクジ類	3kg	収穫3日前まで			6回以内 （株元散布は2回以内）
いちご		1~3kg	収穫前日まで			
セルリー アスパラガス		1~3kg	収穫3日前まで 収穫前日まで			
ふき	ナメクジ類	3kg	収穫7日前まで	6回以内		6回以内（散布及び 株元散布は合計2回以内）
花き類・観葉植物	ナメクジ類 カタツムリ類	1~3kg	—	6回以内		6回以内

【使用上の注意事項】

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 雨や水が直接かかると効果が減少するので圃場では雨が予想される時の処理はさけ、温室では処理後2~3日は灌水がかからないようにしてください。（粒の崩壊）
- なるべく日中乾燥時の使用はさけ、ナメクジ、カタツムリ類が活動をはじめた夕刻に使用してください。また、雨上がりに使用すると効果的です。
- みずかけな（水掛菜）、カラー及び花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用后14日間は入水しないでください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

【安全使用上の注意事項】

- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が多量に食べると死亡するおそれがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないでください。

【保管上の注意事項】

- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

作物別の使用方法・注意事項

【いちご】

- 使用にあたっては、薬剤が果実に直接触れないよう注意してください。
- 定植時に持ち込んだ個体を防除する際は、定植後~マルチ被覆前に処理すると効果的です。
- 株元のマルチの隙間や、マルチと倒れた葉の陰に隠れた個体を防除する際は、粒がマルチの側面に落ちないように注意してください。

【キャベツ、はくさい、レタス】

- 結球開始以降に作物上から散布すると結球部に入り込み、異物混入となるおそれがあります。作物上から散布せず、株元に散布してください。

【非結球あぶらな科葉菜類】

- 圃場全体に処理を行う場合、作物の茎葉が生長してから散布を行うと生長点付近に薬剤が入り込み、異物混入となるおそれがありますので、2葉展開期までに散布を終えることをおすすめします。作物が大きくなり、収穫3日前までに使用する場合は、外周部からのナメクジ類の侵入を防ぐことを目的に最端列の株元に散布してください。また、その際に茎葉の隙間に薬剤が入り込まないように十分留意してご使用ください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 小児の手の届くところに置かないでください。



JAグループ

農協

全農

経済連

全農は登録商標 第4702318号



サンケイ化学株式会社

本社 鹿児島市南栄2丁目9 ☎ 099-268-7588
九州北部営業所 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 ☎ 050-3508-7912
宮崎事務所 宮崎市神宮東3丁目6-19 ☎ 0985-25-7051